

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA

a

ÚVOD DO TEORIE GRAFŮ

Řešené příklady k procvičení

Petr Kovář



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Úvodem

Tento text je koncipován jako pomůcka pro výuku i studium diskrétní matematiky a teorie grafů. Text je rozdělen do několika tématických okruhů, které odpovídají členění témat v předmětu Diskrétní matematika. Najdete zde jednak motivační příklady, při jejichž řešení se využijí postupy a metody diskrétní matematiky a jednak typové příklady, které mají studenta připravit na řešení klasických úloh. Do textu jsou zahrnuta i téma z oblastí, která jsou zařazena do osnov předmětu až od roku 2019.

Na webu homel.vsb.cz/~kov16/predmety.php je navíc k dispozici celá řada interaktivních ukázek a dále na webu dim.vsb.cz jsou pak typové úlohy k dispozici v multimediální formě tzv. „pencastů“.

Chtěl bych poděkovat studentům a později kolegům Pavle Kabelíkové a Tomáši Kupkovi, kteří pomáhali s přípravou některých příkladů a také Michalu Kubesovi, který pozorně prošel část řešených příkladů. Poděkování patří i dalším studentům a kolegům: Martinu Čermákově, Oldřichu Vlachovi, Tereze Kovářové, Adamu Silberovi, Lukáši Rapantovi, Matěji Krbečkovi a Jirkovi Fialovi, kteří odhalili celou řadu chyb a překlepů.

Řešené a neřešené příklady

Pro studenty jsou připraveny soubory dva. Jeden obsahuje pouze zadání příkladů a žádné výsledky, druhý soubor pak obsahuje u většiny příkladů postup řešení, nebo alespoň číselný výsledek pro kontrolu. Při studiu doporučujeme řešit především příklady ze souboru bez řešení a teprve vlastní postupy a výsledky srovnat s druhým souborem. Pro přehlednost je číslování příkladů v obou souborech totožné.

K použitým symbolům

Příklady označené „*“ patří k náročnějším. Jejich řešení obvykle vyžaduje delší výpočet nebo pečlivější rozbor. Při řešení příkladů označených „**“ je třeba nějaký nápad nebo výsledek z jiné oblasti matematiky. Zdůrazněme ale, že hvězdička neznamená nutně „to nikdy nevyřeším“.

Naproti tomu příklady označené „◊“ jsou tak lehké, že jejich řešení je možné z paměti jen s užitím základních pojmu.

V Ostravě 29. října 2020.

Obsah

I Základy diskrétní matematiky 7

1 Posloupnosti, sumy a produkty, zaokrouhllování 8

1.1 Posloupnosti	8
1.2 Sumy a produkty	8
1.3 Aritmetická posloupnost	8
1.4 Geometrická posloupnost	9
1.5 Funkce horní a dolní celé části	10
1.6 Příklady k procvičení	10

2 Výběry prvků s opakováním i bez opakování prvků 12

2.1 Výběry bez opakování	12
2.2 Výběry s opakováním	13
2.3 Příklady k procvičení	13

3 Diskrétní pravděpodobnost 16

3.1 Motivační příklady	16
3.2 Konečný pravděpodobnostní prostor	16
3.3 Disjunktní a nezávislé jevy	18
3.4 Podmíněná pravděpodobnost	19
3.5 Střední hodnota	19
3.6 Náhodné výběry	20
3.7 Příklady k procvičení	21

4 Další početní postupy 23

4.1 Motivační příklady	23
4.2 Princip inkluze a exkluze	23
4.3 Kombinatorické identity	23
4.4 Binomická věta	24
4.5 Důkazy počítáním	24
4.6 Příklady k procvičení	25

5 Rekurentní rovnice 26

5.1 Motivační příklady	26
5.2 Sestavení rekurentní rovnice	26
5.3 Charakteristická rovnice	26
5.4 Tvar obecného řešení	26
5.5 Nalezení obecného řešení	26
5.6 Tvar partikulárního řešení	27
5.7 Řešení nehomogenních rekurentních rovnic	27
5.8 Příklady k procvičení	27

6 Modulární aritmetika 28

6.1 Motivační příklady	28
6.2 Dělitelnost	28
6.3 Euklidův algoritmus	28
6.4 Bézoutova věta	28
6.5 Modulární aritmetika	29
6.6 Kongruence	30
6.7 Soustavy kongruencí	30
6.8 Příklady k procvičení	30

II Úvod do teorie grafů	33
1 Pojem grafu	34
1.1 Motivační příklady	34
1.2 Základní třídy grafů	34
1.3 Stupně vrcholů v grafu	34
1.4 Podgrafy	36
1.5 Isomorfismus grafů	37
1.6 Implementace grafů	38
1.7 Příklady k procvičení	38
2 Souvislost grafu	40
2.1 Souvislost a komponenty grafu	40
2.2 Prohledávání grafu	41
2.3 Vyšší stupně souvislosti	41
2.4 Příklady k procvičení	42
3 Eulerovské a hamiltonovské grafy	43
3.1 Eulerovské grafy	43
3.2 Hamiltonovské grafy	44
3.3 Příklady k procvičení	44
4 Vzdálenost a metrika v grafu	46
4.1 Motivační příklady	46
4.2 Vzdálenost v grafu	46
4.3 Vzdálenost v ohodnocených grafech	47
4.4 Nejkratší cesta v ohodnoceném grafu – Dijkstrův algoritmus	47
4.5 Příklady k procvičení	48
5 Stromy	49
5.1 Motivační příklady	49
5.2 Základní vlastnosti stromů	49
5.3 Kořenové a pěstované stromy	50
5.4 Isomorfismus stromů	51
5.5 Kostry grafů	52
5.6 Příklady k procvičení	52
6 Barevnost a kreslení grafů	54
6.1 Motivační příklady	54
6.2 Vrcholové barvení grafů	54
6.3 Rovinné kreslení grafu	55
6.4 Rozpoznání rovinných grafů	57
6.5 Barvení map a rovinných grafů	58
6.6 Příklady k procvičení	58
7 Toky v sítích	59
7.1 Definice sítě	59
7.2 Hledání maximálního toku	59
7.3 Zobecnění sítí a další aplikace	60
7.4 Příklady k procvičení	61
Literatura	62

Motivační příklady

V této části uvedeme několik typických příkladů, které se během semestru naučíme řešit. Ukazují, čím se diskrétní matematika odlišuje od disciplín, se kterými se studenti už během studia setkali: od matematické analýzy, algebry a geometrie. Všimněte si, že pro řešení příkladů v této sekci sice používáme počty a digramy, avšak nikoliv metody algebry, ani analýzy ani geometrie. Příklady tak vymezují diskrétní matematiku vůči klasickým disciplínám.

0.0.1. Devět kamarádů si na Vánoce dalo dárky. Každý dal dárky třem svým kamarádům. Ukažte, že není možné, aby každý dostal dárky právě od těch tří kamarádů, kterým dárky sám dal.

0.0.2. „Tři domy a tři studny.“ Podle pověsti žily v Temném hvozdě tři čarodejnice. Každá bydlela ve své vlastní slunci a každá potřebovala k provozování své živnosti vodu ze tří studánek: s živou vodou, s mrtvou vodou a s pitnou vodou. Jenomže cestou ke studánkám se čarodejnice nesmí potkat, ani zkřížit vyšlapanou cestičku jiné čarodejnice. Jak mohla vypadat mapa lesa se slujemi, studnami a cestičkami? Pokud řešení neexistuje, pečlivě zdůvodněte.

0.0.3. „Sedm mostů města Královce“ Městem Královec (nyní Kaliningrad na území Ruska) teče řeka Pre-gola, která vytváří dva ostrovy. V 18. století byly ostrovy spojeny s oběma břehy i navzájem celkem sedmi mosty. Otázka zní, zda je možné všechny mosty přejít tak, aby ten, kdo se o to pokouší, vstoupil na každý most pouze jednou.

0.0.4. „Dokonalý kompresní algoritmus“ Najděte alespoň jeden příklad dokonalého bezztrátového kompresního a dekompresního algoritmu, (máte najít dva algoritmy):

1. postup, jak z libovolné posloupnosti bajtů b_1, b_2, \dots, b_n sestavit kratší posloupnost c_1, c_2, \dots, c_m , kde $m < n$, a současně
2. postup, jak z posloupnosti c_1, c_2, \dots, c_m sestavit zpět posloupnost b_1, b_2, \dots, b_n .

Pokud takový algoritmus neexistuje, pečlivě zdůvodněte.


0.0.5. „Lámání čokolády“ Tabulka čokolády se skládá z $m \times n$ čtverečků. Chceme ji nalámat na jednotlivé čtverečky. Najděte (a dokažte) jaký je *nejmenší* počet zlomů, abychom čokoládu $m \times n$ rozdělili na jednotlivé čtverečky?

0.0.6. „Handshaking problem“ Máme skupinu n lidí ($n \geq 2$) z nichž někteří si podali ruce. Ukažte, že ve skupině jsou alespoň dva lidé, kteří podali ruku stejněmu počtu lidí ve skupině.

0.0.7. „Krabice“ Mějme n krabic poskládaných do jednoho vysokého sloupce. Nyní máme za úkol tento sloupec rozložit na menší hromádky, přičemž za každé rozložení sloupce o výšce $a+b$ na dva menší sloupce o výškách a, b dostáváme $a \cdot b$ bodů. Postup končí, jakmile žádné dvě krabice neleží na sobě. Cílem je zvolit takový postup rozkládání sloupců krabic, aby součet bodů za všechny kroky byl co největší.

Část I

Základy diskrétní matematiky



Kolik různých oblastí na obrázku najdete?

1 Posloupnosti, sumy a produkty, zaokrouhlování

Nejprve připomeneme, že známý vztah pro součet prvních n kladných celých čísel je

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n}{2}(n+1). \quad (1)$$

Podrobněji si o základních kombinatorických pojmech přečtete v úvodní kapitole skript [ZDM].

1.1 Posloupnosti

1.1.1. Najděte vztah pro n -tý člen následujících posloupností.

- a) 3, 6, 12, 24, 48, ...
- b) 1, 0, 1, 0, 1, 0, ...
- c) 0, 1, 3, 7, 15, 31, ...

1.1.2. Na účet je vložena částka 50 000 č. Částka bude každoročně úrokována dvěma procenty. Kolik bude na účtu za n let?

1.1.3. Na účet je vložena částka 50 000 č. Částka bude úrokována úrokem dvě procenta ročně. Úroky jsou však připisovány každý měsíc. Kolik bude na účtu za n měsíců?

1.2 Sumy a produkty

1.2.1. Vypočtěte $\sum_{i=-3}^4 \frac{3+i}{2}$.

1.2.2. Najděte obecný vztah pro součet prvních k lichých čísel.

1.2.3. Najděte obecný vztah pro součet prvních k sudých kladných čísel.

1.2.4. Najděte obecný vztah pro součin prvních k přirozených čísel.

1.2.5. Najděte obecný vztah pro součin prvních k sudých kladných čísel.

1.2.6. Zapište a zjednodušte součet $12 + \frac{12}{100} + \frac{12}{10000} + \frac{12}{100000} + \dots$

1.2.7. Ukažte, že aritmetický průměr libovolného sudého počtu po sobě jdoucích čísel není celé číslo.

1.2.8. Mějme čtyři libovolná reálná čísla $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Sestavte předpis posloupnosti a_n pro $n \in \mathbb{N}$ tak, aby $a_1 = a, a_2 = b, a_3 = c, a_4 = d$

1.3 Aritmetická posloupnost

1.3.1. Zjistěte, zda daná posloupnost je aritmetická, nebo ne.

- a) 33, 36, 39, 42, 45, ...
- b) 1, 2, 4, 8, 16, ...
- c) 7, 7, 7, 7, 7, ...
- d) 7, -7, 7, -7, 7, -7, ...

1.3.2. Rozhodněte, zda posloupnost daná vztahem pro n -tý člen je aritmetická, nebo ne.

- a) $a_n = \frac{n}{n-1}$ pro $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$
- b) $a_n = \frac{n+1}{2}$ pro $n \in \mathbb{N}$

c) $a_n = \frac{2}{n+1}$ pro $n \in \mathbb{N}$

d) $a_n = 3 + 4n$ pro $n \in \mathbb{N}$

1.3.3. Najděte vztah pro n -tý člen následujících aritmetických posloupností.

a) $4, 7, 10, 13, 16, \dots$

b) $1, 0, -1, -2, -3, -4, \dots$

c) $1, 0, -1, -2, -3, -4$

1.3.4. U dané aritmetické posloupnosti určete její první člen, její diferenci a vztah pro n -tý člen, víte-li

a) $a_2 = 4, a_4 = -2$.

b) $a_1 + a_3 = 4$ a součet prvních pěti členů je $s_5 = -5$.

1.3.5. Najděte takovou aritmetickou posloupnost (a_n) , že $a_1 + a_6 = 24, a_4 + a_5 = 12$.

1.3.6. Určete součet prvních deseti členů aritmetické posloupnosti, víte-li

a) $a_2 = 4, d = 2.5$.

b) $a_1 + a_3 = 24$ a $s_5 = 35$.

1.3.7. Dokažte, že pro libovolná $a, b \in \mathbb{R}$ jsou čísla $c_1 = (a - b)^2, c_2 = a^2 + b^2, c_3 = (a + b)^2$ tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.

1.4 Geometrická posloupnost

1.4.1. Zjistěte, zda daná posloupnost je geometrická, nebo ne.

a) $33, 36, 39, 42, 45, \dots$

b) $1, 2, 4, 8, 16, \dots$

c) $7, 7, 7, 7, 7, \dots$

d) $7, -7, 7, -7, 7, -7, \dots$

1.4.2. Rozhodněte, zda posloupnost daná vztahem pro n -tý člen je geometrická, nebo ne.

a) $a_n = \frac{n}{n-1}$ pro $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

b) $a_n = \frac{1}{3^n}$ pro $n \in \mathbb{N}$

1.4.3. Najděte vztah pro n -tý člen následujících geometrických posloupností.

a) $3, 6, 12, 24, 48, \dots$

b) $2, -\sqrt{2}, 1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, \dots$

c) $500, 50, 5, \frac{1}{2}, \frac{1}{20}, \dots$

d) $54, 18, 6, 2$

1.4.4. U dané geometrické posloupnosti určete její první člen, její kvocient a vztah pro n -tý člen, víte-li

a) $a_1 \cdot a_3 = -9, a_2 \cdot a_4 = 9$

b) $a_1 \cdot a_3 = 9, a_2 \cdot a_5 = -9$

1.4.5. Horkovzdušný balón vystoupá za minutu po startu 25 metrů vysoko. Za každou další minutu vystoupá 75 % výšky, kterou vystoupal za předchozí minutu. Jak dlouho potrvá balónu, než bude alespoň 110 metrů vysoko?

1.4.6. Vypočtěte součet prvních čtyř členů posloupnosti $\left(\frac{2^{n+1}}{5^{n-3}}\right)$.

1.4.7. Dokažte, že pro libovolná $a, b \in \mathbb{R}$, pro která $a + b \neq 0, a - b \neq 0$, jsou čísla $c_1 = (a - b)^2, c_2 = \frac{a-b}{a+b}, c_3 = \frac{1}{(a+b)^2}$ tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti.

1.4.8. Odvod'te vztah pro součet prvních n členů geometrické posloupnosti s prvním členem a_1 a kvocientem q .

1.4.9. Dokažte nebo vyvraťte: každá aritmetická posloupnost s alespoň třemi členy, která je současně geometrická, je konstantní.

1.4.10. Dokažte nebo vyvraťte: každá konstantní posloupnost s alespoň třemi členy je současně aritmetická posloupnost i geometrická posloupnost.

1.4.11. Najděte nekonečně mnoho posloupností, které nejsou konstantní a jsou aritmetické i geometrické současně.

1.5 Funkce horní a dolní celé části

1.5.1. Upravte na celočíselný zlomek $31,2\overline{71}$.

1.5.2.* Zapište funkci $\lfloor \rfloor$ pomocí $\lceil \rceil$.

1.5.3.* Zapište funkci $\lceil \rceil$ pomocí $\lfloor \rfloor$.

1.5.4. Upravte na celočíselný zlomek $1,\overline{23}$.

1.5.5.* Ukažte, že $\lfloor 1.\overline{9} \rfloor = 2$

1.5.6.* Ukažte, že $\lceil 1.\overline{9} \rceil = 2$

1.5.7. Ukažte, že $\lceil \lceil x \rceil \rceil = \lceil x \rceil$

1.5.8. Jak vyjádříte klasické zaokrouhlení pomocí $\lfloor \rfloor$?

1.5.9.* Jak vyjádříte klasické zaokrouhlení pomocí $\lceil \rceil$?

1.5.10. Nakreslete graf funkcí $\lfloor \sin x \rfloor$, $\lceil \cos x \rceil$ a $\lfloor \tan x \rfloor$.

1.5.11. Kolik prvků má $2^{\{1,2,3,4\}}$? Rozepište.

1.6 Příklady k procvičení

1.6.1. Vypočítejte následující sumy nebo produkty.

a) Vypočtěte $\sum_{i=2}^5 \frac{1}{2^i}$.

b) Vypočtěte $\sum_{j=2}^5 \frac{1}{2^j}$.

c) Vypočtěte $\sum_{i=1}^4 i^3$.

d) Vypočtěte $\prod_{i=0}^n \frac{i}{i+1}$.

e) Vypočtěte $\prod_{i=1}^n \frac{i}{i+1}$.

1.6.2. Najděte vztah pro n -tý člen následujících posloupností

a) $1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$

b) $0, 1, 3, 7, 16, 31, \dots$

1.6.3. Existuje taková posloupnost $(a_i)_{i=1}^n$, že $\sum_{i=1}^n a_i < \sum_{i=1}^n (-a_i)$? Pokud ano, uveďte příklad!

1.6.4. Existuje taková posloupnost $(a_i)_{i=1}^n$, že $\sum_{i=1}^n a_i > 0$ a $\prod_{i=1}^n a_i < 0$? Pokud ano, uveďte příklad!

1.6.5. Existuje taková posloupnost *kladných* čísel $(a_i)_{i=1}^n$, že $\sum_{i=1}^n a_i > \prod_{i=1}^n a_i$? Pokud ano, uveďte příklad!

1.6.6. ♦ Zapište funkci součet prvků množiny $A = \{18, 25, 31, 67, 202, 301, 356\}$ pomocí sumy.

1.6.7. Do čtverce o straně 1 je vepsán čtverec, jehož vrcholy jsou středy stran původního čtverce, do tohoto vepsaného čtverce je opět stejným způsobem vepsán další čtverec, ... Jaký je obsah desátého čtverce?

1.6.8. ♦ Vypočítejte

- a) $\lfloor 2.7 \rfloor$.
- b) $\lfloor -2.7 \rfloor$.
- c) $\lfloor \frac{22}{10} \rfloor$.
- d) $\lfloor -\frac{22}{10} \rfloor$.
- e) $\lfloor -\pi \rfloor$.
- f) $\lfloor -e \rfloor$.
- g) $P = \lfloor \frac{n+1}{n} \rfloor$, pro $n \in \mathbb{N}$

1.6.9. Dělové koule si dělostřelci stavěli do pyramid.

- a) Pyramida bud' měla čtvercovou základnu např. 4×4 koule, na ní dali vrstvu 3×3 koule, pak 2×2 koule a na vrchol 1 kouli. Tato pyramida měla celkem 30 koulí. Kolik celkem koulí by měla pyramida o základně $n \times n$ koulí?
- b) Pyramida mohla mít založenou podstavu ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku z 15 koulí, na ní byla další vrstva 10 koulí, další vrstva měla 6 koulí, pak 3 koule a na vrcholu byla 1 koule. Celkem měla taková pyramida 35 koulí. Kolik celkem koulí by měla pyramida o základně s hranou z n koulí?

1.6.10. Strany pravoúhlého trojúhelníka tvoří geometrickou posloupnost. Jaký je kvocient této posloupnosti?

2 Výběry prvků s opakováním i bez opakování prvků

Podrobněji si o základních o kombinatorických výběrech přečtete ve skriptech [ZDM].

2.1 Výběry bez opakování

2.1.1. \diamond Pro jaké hodnoty n a k je více k -prvkových podmnožin z n prvkové množiny než $(n-k)$ -prvkových podmnožin?

2.1.2. Pro jaké hodnoty n a k je více k -prvkových variací z n prvkové množiny než $(n-k)$ -prvkových variací?

2.1.3. Vyjádřete bez kombinačních čísel $\binom{3n}{3}$.

2.1.4. Tenisový turnaj se hraje systémem každý s každým. Kolik se bude hrát zápasů, jestliže

- a) se turnaje zúčastní 8 hráčů?
- b) se turnaje zúčastní 21 hráčů?

2.1.5. Máme prázdnou množinu \emptyset .

- a) Kolika způsoby můžeme seřadit prvky \emptyset do posloupnosti?
- b) Kolika způsoby můžeme vybrat \emptyset z nějaké množiny?
- c) Jak by se tyto počty změnily, kdyby $0! \neq 1$?

2.1.6. Tenisového turnaje se účastní 8 hráčů. Kolik je různých pořadí na stupních vítězů?

2.1.7. Upravte a porovnejte $\binom{6n}{3}$ a $\binom{3n}{6}$.

2.1.8. \diamond Kolik způsoby se může postavit pět artistů na sebe?

2.1.9. Kolika způsoby je možné napsat číslo k jako součet n sčítanců 1 a 2? (počet sčítanců n je pěvně dán) Předpokládáme, že rozlišujeme pořadí sčítanců.

2.1.10. Máme n lidí. Jak velké skupinky vybírat, aby byl počet možností co největší?

2.1.11. Ukažte několika způsoby, že $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

2.1.12. Ukažte několika způsoby, že $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

2.1.13.* Hokejový trenér má k dispozici 13 útočníků a 9 obránců. Kolika způsoby vybereme pětku (2 obránce + 3 útočníci), jestliže jeden konkrétní útočník může hrát i v obraně?

2.1.14. Určete počet všech pěticiferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se každá z deseti číslic vyskytuje nejvýše jednou. Kolik z nich je menších než 50 000?

2.1.15. Na konferenci vystoupí šest přednášejících: A, B, C, D, E, F. Určete počet

- a) všech možných pořadí jejich vystoupení;
- b) všech pořadí, v nichž vystoupí A po E;
- c) všech pořadí, v nichž vystoupí A ihned po E.

2.1.16. Kolika způsoby můžeme n lidí posadit

- a) do řady
- b) do řady, v níž je člověk A na kraji;
- c) do řady tak, aby lidé A a B neseděli vedle sebe;

- d) kolem kulatého stolu (dvě rozesazení považujeme za různá, pokud se alespoň jednomu člověku změní soused po pravé či levé ruce).

2.1.17. Kolika způsoby můžeme ze sedmi mužů a čtyř žen vybrat šestičlennou skupinu, tak aby v ní byly

- a) právě dvě ženy;
- b) alespoň dvě ženy;
- c) nejvýše dvě ženy;

2.1.18. Vlajka má být sestavena ze tří různobarevných vodorovných pruhů. K dispozici jsou látky barvy bílé, červené, modré, zelené a žluté.

- a) Kolik různých vlajek můžeme sestavit?
- b) Kolik z nich má modrý pruh?
- c) Kolik jich má modrý pruh uprostřed?
- d) Kolik jich nemá uprostřed červený pruh?

2.2 Výběry s opakováním

2.2.1. Kolika způsoby můžeme postavit šest artistů do pyramidy $3 + 2 + 1$? Rozlišujeme pouze kdo stojí na zemi, kdo v první vrstvě a kdo nahore, ale už nerozlišujeme, komu stojí další řada na levém a komu na pravém rameni.

2.2.2. Kolik existuje anagramů slova MISSISSIPPI?

2.2.3. Kolik existuje anagramů slova MISSISSIPPI, které neobsahují IIII?

2.2.4. Kolik existuje anagramů slova MISSISSIPPI, které neobsahují II?

2.2.5. Na patnáct stožárů v řadě budou pověšeny vlajky pěti zemí, každá třikrát. Kolik existuje možností?

2.3 Příklady k procvičení

2.3.1. Vypočítejte, kolika způsoby lze na klasické šachovnici (8×8 polí) vybrat

- a) trojici libovolných políček,
- b) trojici políček tak, že žádné dvě neleží v též sloupci,
- c) trojici políček tak, že žádné dvě neleží v též sloupci ani v též řadě,
- d) trojici políček, která jsou všechna též barvy.

2.3.2. Kolika způsoby je možné napsat k jako součet n sčítanců? Předpokládáme, že rozlišujeme pořadí sčítanců.

2.3.3. Kolika způsoby můžeme na šachovnici rozestavit všech 32 figur? Započítáme i ty možnosti, které nemohou nastat během regulérní hry (pěšec v první řadě, dva králové na sousedních polích, dva bílí střelci na černých polích, ...).

2.3.4. Kolika způsoby je možné napsat číslo 7 jako součet právě čtyř přirozených sčítanců? (dovolíme i nulové sčítance!) Předpokládáme, že rozlišujeme pořadí sčítanců.

2.3.5. Kolika způsoby je možné napsat číslo 7 jako součet právě čtyř kladných přirozených sčítanců? Předpokládáme, že rozlišujeme pořadí sčítanců.

2.3.6. Kolika způsoby je možné napsat k jako součet n kladných sčítanců? Předpokládáme, že rozlišujeme pořadí sčítanců.

2.3.7. Máme 10 stejných figurek a čtyři různé barvy. Kolik existuje možností, jak všechny figurky obarvit?

2.3.8. Máme 7 různých figurek a tři různé barvy. Kolik existuje možností, jak všechny figurky obarvit?

2.3.9. Máme 10 stejných figurek a čtyři různé barvy. Kolik existuje možností, jak některé figurky obarvit?

2.3.10. Máme 10 stejných figurek a čtyři různé barvy. Kolik existuje možností, jak všechny figurky obarvit, přičemž od každé barvy by měla být alespoň jedna figurka?

2.3.11. Kolika způsoby můžeme posadit n lidí kolem kulatého stolu? Ve dvou rozdílných rozesazeních má některý člověk jiného souseda po levé nebo po pravé ruce.

2.3.12. Kolika způsoby můžeme posadit n manželských párů kolem kulatého stolu tak, aby manželé seděli vždy vedle sebe? Ve dvou rozdílných rozesazeních má některý člověk jiného souseda po levé nebo po pravé ruce.

2.3.13. Dříve byly státní poznávací značky osobních automobilů tvořeny usporádanou sedmicí, jejíž první tři členy byly písmena a další čtyři číslice. Kolik poznávacích značek bylo možno sestavit, jestliže pro první část značky bylo možno použít každé z 26 písmen (každá možnost povolena nebyla).

2.3.14. Určete počet všech *nejvýše k -prvkových* podmnožin n -prvkové množiny.

2.3.15. Kolik je všech pěticiferných přirozených čísel? Kolik z nich je menších než 50 000?

2.3.16. Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel dělitelných 9, v jejichž dekadickém zápisu mohou být pouze číslice 0, 1, 2, 5, 7.

2.3.17. V sáčku jsou červené, modré a zelené kuličky (kuličky též barvy jsou nerozlišitelné). Určete, kolika způsoby lze vybrat pět kuliček, jestliže v sáčku je

- a) alespoň pět kuliček od každé barvy;
- b) pět červených, čtyři modré a čtyři zelené kuličky.

2.3.18.* Kolika způsoby je možné napsat číslo k jako součet sčítanců 1 a 2? Předpokládáme, že rozlišujeme pořadí sčítanců.

2.3.19.* Jaký je počet všech trojúhelníků, z nichž žádné dva nejsou shodné a každá jejich strana má velikost vyjádřenou některým z čísel $n+1, n+2, n+3, \dots, 2n$, kde n je přirozené číslo.

2.3.20. Kolik přímek lze proložit 7 body, jestliže žádné tři body neleží v přímce?

2.3.21. Kolik přímek lze proložit 7 body, jestliže právě tři body leží v přímce?

2.3.22. Máme dány dvě mimoběžky. Na jedné je m bodů, na druhé n bodů. Kolik lze sestrojit čtyřstěnů s vrcholy v daných bodech?

2.3.23. Kolika způsoby můžete seřadit v poličce pět učebnic angličtiny, čtyři učebnice matematiky a dvě učebnice českého jazyka, jestliže mají zůstat rozděleny do skupin po jednotlivých předmětech?

2.3.24. Na hlídku půjdou 4 vojáci z čety. Kolik vojáků má četa, jestliže výběr je možno provést 210 způsoby?

2.3.25. Palindrom je slovo, které se píše stejně jako pozpátku. Anglická abeceda má 26 písmen. Kolik existuje palindromů (i nesmyslných) délky n z písmen anglické abecedy?

2.3.26. Házíme třikrát kostkou. Kolik existuje takových možností, kdy v každém dalším hodu padají větší a větší čísla?

2.3.27. Byli jsme čtyři, seděli v baru a popíjeli. Trápilo nás špatné svědomí, že místo abychom v životě dělali něco pořádného, jsme závislí na alkoholu. Tu k nám přistoupil rozjařený barman a namíchal nám sedm různých drinků tak, aby každý dostal alespoň jeden. Kolika způsoby to mohl provést, jestliže rozlišujeme pořadí drinků, které jsme vypili.

2.3.28. Počítáč Kecálek ve filmu Rumburak dostal za úkol najít všechny dvojice slov složené z dvanácti písmen (mezeru nepočítáme). Kolik takových slov z 26 písmen existuje?

2.3.29. Zaklínadlo pro přesun do říše pohádek ve filmu Rumburak zní HUBERO KORORO. Kolik existuje anagramů tohoto zaklínadla složených ze dvou šestipísmených slov?

2.3.30. Zaklínadlo pro změnu počasí ve filmu Rumburak zní RABERA TAREGO. Kolik existuje anagramů tohoto zaklínadla složených ze dvou šestipísmených slov?


2.3.31. Na běžných dominových kostkách se vyskytuje oka v počtu $0, 1, \dots, 6$. Každá dvojice počtu ok se s sadě vyskytuje na právě jedné kostce. Všechny kostky domino je možné položit do jediné řady tak, aby navazující kostky sdílely stejný počet ok. Nyní n -dominem budeme rozumět takovou sadu kostek, která obsahuje všechny dvojice počtu ok z rozsahu $0, 1, \dots, n$. Pro jaká přirozená čísla n lze všechny kostky n -domina položit do jediné řady?

2.3.32. Máme čtverečkovou síť $m \times n$ čtverečků. Kolik různých obdélníků najdeme v síti?

2.3.33. Keltský druid Travedik vaří lektvary ze sta různých bylin. Mezi nimi je i šalvěj třeskutá, což je druidova nejmocnější bylinka. Při vaření lektvarů může použít jednu, dvě, tři, či libovolný větší počet bylin. Kterých lektvarů je více, těch, které šalvěj třeskutou obsahují a nebo těch, které ji neobsahují?

2.3.34. Keltský druid Travedik vaří lektvary ze sta různých bylin. Mezi nimi jsou i šalvěj třeskutá a pu-cheinříček smradlavý, což jsou dvě Travedikovy nejmocnější bylinky. Při vaření lektvarů může použít jednu, dvě, tři, či libovolný větší počet bylin. Kterých lektvarů je více, těch, které obsahují šalvěj třeskutou a pu-cheinříček smradlavý a nebo těch, které alespoň jednu z těchto bylin neobsahují?

2.3.35. Hra *Tic-tac-toe* je hra s tužkou a papírem pro dva hráče X a O. Hráči střídavě zapisují křížky a kolečka do čtvercové sítě políček 3×3 . Obvykle začíná X, jako na Obrázku 2.1. Hráč, který jako první umístí tři své symboly v jedné řadě, sloupci nebo diagonále, vyhraje.



Obrázek 2.1: Jedna hra *Tic-tac-toe*.

- a)[◊] Kolik existuje různých rozmístění křížků a koleček (pět křížků a čtyři kolečka) na herním plánu?
- b) Kolik existuje různých rozmístění křížků a koleček na herním plánu, jestliže rozlišujeme pořadí tahů, křížky a kolečka se střídají?
- c) Kolik existuje různých her Tic-tac-toe, kdy vyhraje X v pátém tahu?
- d) Kolik existuje různých her Tic-tac-toe, kdy vyhraje O v šestém tahu?
- e) Kolik existuje různých her Tic-tac-toe, kdy vyhraje X v sedmém tahu?
- f) Kolik existuje různých her Tic-tac-toe, kdy vyhraje O v osmém tahu?
- g)* Kolik existuje různých her Tic-tac-toe, kdy vyhraje X v devátém tahu?
- h) Kolik existuje různých her Tic-tac-toe, které končí remízou?
- i) Kolik existuje všech různých her Tic-tac-toe?

2.3.36. Máme dostatečný počet kuliček červené, modré a zelené barvy. Kolika způsoby můžeme vybrat 30 kuliček tak, aby od žádných dvou barev nebyl stejný počet kuliček?

3 Diskrétní pravděpodobnost

Pokud není řečeno jinak, tak v příkladech této kapitoly předpokládáme, že balíček karet obsahuje 32 karet, od sedmičky po eso ve čtyřech různých barvách (srdce, piky, káry a kříže). Dále předpokládáme, že klasická šestistěnná kostka je vyrobena tak, že součet ok na protilehlých stěnách je vždy sedm.

Všimněte si, že i v případě, kdy máme zamíchaný celý balíček karet, nemusíme někdy uvažovat šech 32! pořadí. Pokud se zajímáme o nějaký výběr, stačí pracovat s nějakým náhodným výběrem.

Podrobněji si o diskrétní pravděpodobnosti můžete přečíst ve skriptech [ZDM].

3.1 Motivační příklady

3.1.1. Na jednom Americkém televizním kanálu běžela *Montyho Show*. Soutěžící měli možnost získat automobil, jestliže si vyberou ze tří dveří ty dveře, za kterými se automobil nachází. Soutěžící si jedny dveře zvolil a potom Monty šel a otevřel některé ze dvou zbývajících dveří. Vždy otevřel ty dveře, za kterými nestál automobil, ale koza. Nyní měl soutěžící možnost změnit svou volbu a vybrat si libovolné ze dvou stále zavřených dveří. Předpokládáme, že pořadatelé vyberou na začátku náhodně jedny ze tří dveří, za které zaparkují automobil a za další dvě postaví kozy. Je lepší změnit svoji volbu, nebo zůstat u původního tipu a nebo je to jedno? S jakou pravděpodobností získá soutěžící výhru jestliže změní svoji volbu? Svou odpověď vysvětlete.

3.2 Konečný pravděpodobnostní prostor

3.2.1. Hodíme kostkou.

- a) Jaká je pravděpodobnost, že padne sudé číslo?
- b) Jaká je pravděpodobnost, že padne prvočíslo?
- c) Jaká je pravděpodobnost, že padne jednička nebo dvojka?
- d) Jaká je pravděpodobnost, že součet horní a spodní stěny je 7?
- e) Jaká je pravděpodobnost, že součet horní a spodní stěny je 3?

3.2.2. Hodíme kostkou, která není spravedlivá, různá čísla padají s různou pravděpodobností. Čísla 1, 2 padnou s pravděpodobností $\frac{1}{5}$, čísla 4, 5 a 6 padnou s pravděpodobností $\frac{1}{7}$. Pravděpodobnost čísla 3 není udána.

- a) Jsou uvedené pravděpodobnosti konzistentní?
- b) S jakou pravděpodobností padne číslo 3?
- c) Jaká je pravděpodobnost, že padne sudé číslo?
- d) Jaká je pravděpodobnost, že padne prvočíslo?
- e) Jaká je pravděpodobnost, že padne jednička nebo dvojka?
- f) Jaká je pravděpodobnost, že součet horní a spodní stěny je 7?
- g) Jaká je pravděpodobnost, že součet horní a spodní stěny je 3?

3.2.3. Hodíme dvěma kostkami.

- a) Je pravděpodobnější, a) že padne 5 a 6 nebo b) že padnou dvě 3?
- b) Jaká je pravděpodobnost, že padne součin 12?
- c) Jaká je pravděpodobnost, že padne součin 4?

- d) Jaká je pravděpodobnost, že padne součin 14?
- e) Jaká je pravděpodobnost, že padne součet 10?

3.2.4. Sestavte funkci $P(n)$, která bude udávat pravděpodobnost, že při současném hodu $n \geq 1$ kostkami

- a) padne součet n .
- b) padne součet 3.

3.2.5. Hodíme současně sedmi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že

- a) padne součet 12?
- b) padne součet 13?

3.2.6. Hodíme n -stěnnou kostkou očíslovanou $1, 2, \dots, n$. Jaká je pravděpodobnost, že padne liché číslo?

3.2.7. Hodíme n -stěnnou prvočíselnou kostkou (stěny jsou očíslované užitím prvních n prvočísel). Jaká je pravděpodobnost, že padne liché číslo?

3.2.8. Máme zamíchaný balíček 32 hracích karet. Jaká je pravděpodobnost, že

- a) první karta v balíčku je eso?
- b) třetí karta v balíčku je desítka?
- c) třetí karta v balíčku je desítka, víme-li, že první dvě karty jsou dáma a král?
- d) třetí karta v balíčku je desítka, víme-li, že první dvě karty jsou sedmička a desítka?

3.2.9. Házíme dvěma kostkami: šestistěnnou a dvanáctistěnnou. Jaká je pravděpodobnost, že na obou padne stejné číslo?

3.2.10. Házíme třemi kostkami: čtyřstěnnou, šestistěnnou, desetistěnnou. Jaká je pravděpodobnost, že na všech padne stejně číslo?

3.2.11. Házíme třemi šestistěnnými kostkami.

- a) Je lepší vsadit si, že nepadne žádná šestka, nebo že padne alespoň jedna šestka?
- b) Jaká je pravděpodobnost, že padne právě jedna šestka?
- c) Jaká je pravděpodobnost, že padnou alespoň dvě šestky?

3.2.12. Házíme desetistěnnou kostkou.

- a) Hodíme jednou. Jaká je pravděpodobnost, že padne prvočíslo?
- b) Házíme dvakrát. Jaká je pravděpodobnost, že padne lichý součet?
- c) Házíme dvakrát. Jaká jsou pravděpodobnosti jednotlivých součtů?

3.2.13. Házíme čtyřikrát mincí. Jaká je pravděpodobnost, že

- a) padne čtyřikrát za sebou hlava?
- b) padne nejprve hlava, potom orel, znova orel a nakonec hlava?
- c) padne dvakrát hlava a dvakrát orel (v libovolném pořadí)?
- d) padne alespoň jednou hlava?

3.2.14. Hodíme třemi stejnými kostkami.

- a) Jaká je pravděpodobnost, že padne 2, 4, 6?
- b) Jaká je pravděpodobnost, že padne 2, 4, 4?

3.2.15. Ve třídě je 25 žáků. Předpokládejme, že nikdo nemá narozeniny 29. února (v přestupném roce) a že každý den v roce se rodí přibližně stejně dětí. a) S jakou pravděpodobností budou alespoň dva spolužáci slavit narozeniny ve stejný den? b) Kolik nejméně musí být ve třídě žáků, aby byla pravděpodobnost společného data narozenin dvou spolužáků větší než $\frac{1}{2}$?

3.3 Disjunktní a nezávislé jevy

3.3.1. Dva hráči hází kostkou. Jsou jejich hody nezávislé? I když někdo hodí tři šestky za sebou?

3.3.2. Mějme dva různé elementární jevy.

- a) Jsou různé elementární jevy vždy disjunktní?
- b) Jsou různé elementární jevy vždy nezávislé?

3.3.3. Mějme dva disjunktní jevy.

- a) Mohou být dva disjunktní jevy nezávislé?
- b) Je prázdný jev nezávislý s libovolným jevem?

3.3.4. Udejte příklad dvou různých jevů, které nejsou disjunktní.

3.3.5. Hodíme dvěma kostkami.

- a) Jsou jevy A : *padl součet 4* a B : *padl součin 4* disjunktní?
- b) Jsou jevy A : *padl součet 6* a B : *padl součin 6* disjunktní?

3.3.6. Mějme tři jevy A, B, C . Víme, že jevy A a B jsou nezávislé, jevy B a C jsou nezávislé a jevy A a C jsou nezávislé.

- a) Jsou jevy A, B, C nezávislé jako trojice?
- b) Mohou být ve speciálním případě nezávislé? Kdy?

3.3.7. Máme zamíchaný balíček 32 karet.

- a) Rozdáme dvěma hráčům po třech kartách. Jsou výběry karet nezávislé?
- b) Dáme prvnímu hráci tři karty a zbylé karty zamícháme. Potom druhý hráč dostane také tři karty. Jsou výběry karet nezávislé?
- c) Dáme prvnímu hráci tři karty. On si je zapamatuje a vrátí do balíčku. Potom karty zamícháme a druhý hráč dostane tři karty. Jsou výběry karet nezávislé?
- d) Hráč dostane pět karet, potom karty vrátí a po zamíchání dostane znova pět karet. Jaká je pravděpodobnost, že měl pokaždé fullhouse (3+2 stejné hodnoty)?
- e) Hráč dostane pět karet, schová si je dostane dalších pět karet. Jaká je pravděpodobnost, že měl královský poker (4 esa a další karta stejné hodnoty) dvakrát za sebou?

3.3.8. Hodíme dvěma kostkami, jednou zelenou a jednou červenou. Jsou jevy A : „na obou padne stejné číslo“ a B : „na zelené kostce padne šestka“ nezávislé?

3.3.9. Hodíme dvěma kostkami. Jsou jev „padl součet 6“ a jev „padl součin 8“ nezávislé?

3.3.10. Mějme pravděpodobnostní prostor $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ s uniformní pravděpodobností (házíme osmistěnnou kostkou). Jsou jevy $A = \{1, 2, 3, 4\}$ a $B = \{5, 6, 7, 8\}$ nezávislé?

3.3.11. Mějme pravděpodobnostní prostor $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ s uniformní pravděpodobností (házíme osmistěnnou kostkou). Jsou jevy $A = \{1, 2, 3, 4\}$ (padlo malé číslo) a $B = \{1, 3, 5, 7\}$ (padlo liché číslo) nezávislé?

3.3.12. Mějme pravděpodobnostní prostor $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ s uniformní pravděpodobností (házíme šestistěnnou kostkou). Jsou jevy $A = \{1, 2, 3\}$ (padlo malé číslo) a $B = \{1, 3, 5\}$ (padlo liché číslo) nezávislé?

3.3.13. Házíme n -stěnnou kostkou. Nadefinujeme jev A , že padne malé číslo $1, 2, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ a jev B , že padne liché číslo. Pro jaká n jsou jevy A a B nezávislé?

3.4 Podmíněná pravděpodobnost

3.4.1. Jaká je pravděpodobnost při hodu klasickou kostkou, že padne číslo větší než 3 víme-li, že padlo liché číslo.

3.4.2. V krabici je 5 koulí, 3 jsou bílé a 2 černé. Vytáhneme postupně dvě koule. Jaká je pravděpodobnost, že první je bílá a druhá černá?

3.4.3. V krabici je 5 koulí, 3 jsou bílé a 2 černé. Vytáhneme postupně dvě koule. Počítejme: Všechny možnosti, jak mohou dopadnout losování jsou: bílá-bílá, bílá-černá, černá-černá a černá-bílá. Pouze jedna z nich je příznivá: bílá-černá. Dostaneme pravděpodobnost $P = \frac{1}{4}$. Srovnejte s řešením Příkladu 2. Co je špatně? Vysvětlete!

3.4.4. V krabici je 5 koulí, 3 jsou bílé a 2 černé. Vytáhneme postupně dvě koule. Počítejme: Všechny možnosti, jak může dopadnout losování je $\binom{5}{2} = 10$. Příznivé jsou ty, kdy vybereme nejprve bílou a potom černou: Dostaneme pravděpodobnost $P = \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{2}{1}}{|\Omega|} = \frac{3 \cdot 2}{10} = \frac{3}{5}$. Srovnejte s řešením Příkladu 2. Co je špatně? Vysvětlete!

3.4.5. Z celkové produkce závodu jsou 4% zmetků. Z dobrých výrobků je 75% standardních. Určete pravděpodobnost, že náhodně vybraný výrobek je standardní.

3.5 Střední hodnota

3.5.1. Házíme kostkou, která není spravedlivá, různá čísla padají s různou pravděpodobností. Čísla 1, 2 padnou s pravděpodobností $\frac{1}{5}$, čísla 4, 5 a 6 padnou s pravděpodobností $\frac{1}{7}$. Pravděpodobnost čísla 3 není udána. Jaký je střední počet počtu ok, která na kostce padnou?

3.5.2. Jaká je střední hodnota počtu šestek, které padnou při hodu pěti kostkami?

3.5.3. Máme šestistěnnou kostku.

- Jaký je průměrný součet čísel na horní a spodní stěně kostky vyrobené tak, že 1 je naproti 6, 2 naproti 5 a 3 naproti 4?
- Jaký je průměrný součet čísel na horní a spodní stěně kostky vyrobené tak, že 1 je naproti 2, 3 naproti 5 a 4 naproti 6?

3.5.4. Máme dva sáčky s kuličkami. V prvním sáčku jsou dvě kuličky s číslem 2 a tři kuličky s číslem 3. Ve druhém sáčku jsou 3 kuličky s číslem 4 a 2 kuličky s číslem 5. Taháme z obou sáčků po jedné kuličce. Jaký je průměrný součet tažených čísel?

3.5.5. Uměli byste rozmístit čísla 1 až 6 na spravedlivou kostku tak, aby střední hodnota součtu horní a spodní stěny byla jiná než 7?

3.5.6. Najděte vhodná čísla a_1, a_2, \dots, a_6 a rozmístěte je na spravedlivou kostku tak, aby střední hodnota součtu horní a spodní stěny byla jiná než průměr hodnot a_1 až a_6 vynásobený dvěma.

3.5.7. Najděte vhodná celá čísla a_1, a_2, \dots, a_6 a rozmístěte je na spravedlivou kostku tak, aby střední hodnota součinu horní a spodní stěny byla jiná než průměr hodnot a_1 až a_6 umocněný na druhou.

3.5.8.* Najděte vhodná různá celá čísla a_1, a_2, \dots, a_6 a rozmístěte je na spravedlivou kostku tak, aby střední hodnota součinu horní a spodní stěny byla stejná jako průměr hodnot a_1 až a_6 umocněný na druhou.

3.5.9. Kolik je třeba průměrně hodů mincí, aby vyšly dva stejné výsledky?

3.5.10.* Kolik je třeba průměrně hodů mincí, kde hlava má pravděpodobnost p (p nemusí být $\frac{1}{2}$), aby vyšly dva stejné výsledky?

3.5.11.* Kolik je třeba průměrně hodů spravedlivou mincí, aby padla první hlava?

3.5.12.* Kolik je třeba průměrně hodů mincí, kde hlava má pravděpodobnost p (p nemusí být $\frac{1}{2}$), aby padla první hlava?

3.5.13. Jaká je střední hodnota počtu políček, o které se vaše figurka přesune v jednom kole hry „Člověče, nezlob se!“, pokud se

- a) po třetí šestce za sebou již znova nehází?
- b) opakovaně hází dokud padají šestky?

3.5.14. Při objednávání obědů u terminálu vedle jídelny nevíte, která jídla jsou k dispozici a která ne. Jestliže tři z pěti jídel již není možné objednat. Jaký je střední počet pokusů než si objednáme jídlo, které se ještě vaří?

3.5.15. Při objednávání obědů u terminálu vedle jídelny nevíte, která jídla jsou k dispozici a která ne. Je-li v menu výběr z n jídel a jestliže $k \leq n$ je počet jídel z pěti, která je možno objednat, jaký je střední počet pokusů než si objednáme jídlo, které se ještě vaří?

3.6 Náhodné výběry

3.6.1. Máme sedmiprvkovou množinu A .

- a) S jakou pravděpodobností vybereme náhodně jednu konkrétní pětiprvkovou podmnožinu mezi všemi pětiprvkovými podmnožinami?
- b) S jakou pravděpodobností vybereme náhodně jednu konkrétní pětiprvkovou podmnožinu mezi všemi podmnožinami?
- c) S jakou pravděpodobností vybereme náhodně některou pětiprvkovou podmnožinu mezi všemi podmnožinami?

3.6.2. S jakou pravděpodobností vybereme náhodně jednu k -prvkovou podmnožinu n -prvkové množiny?

3.6.3. S jakou pravděpodobností vybereme náhodně k -prvkovou podmnožinu mezi všemi podmnožinami n -prvkové množiny?

3.6.4. Jaká je pravděpodobnost, že náhodná podmnožina n -prvkové množiny obsahuje jeden pevně zvolený prvek?

3.6.5. Máme náhodnou posloupnost čtyř bitů.

- a) S jakou pravděpodobností se jedná o „0011“?
- b) S jakou pravděpodobností obsahuje dvě jedničky a dvě nuly?

3.6.6. S jakou pravděpodobností obsahuje více jedniček než nul?

3.6.7. Máme náhodnou permutaci pětiprvkové množiny.

- a) Jakou pravděpodobnost má jedna náhodná permutace?
- b) Jakou pravděpodobnost má permutace, kde číslo 1 následuje bezprostředně za číslem 2?
- c) Jakou pravděpodobnost má permutace, kde číslo 1 následuje za číslem 2?
- d) Jakou pravděpodobnost má permutace, kde čísla 1, 2 jsou vedle sebe?

3.7 Příklady k procvičení

3.7.1. Házíme opakovaně spravedlivou minci.

- a) Jaká je pravděpodobnost, že při šesti hodech mincí padne hlava i orel stejněkrát?
- b) Jaká je pravděpodobnost, že při n hodech mincí padne hlava i orel stejněkrát?

3.7.2. Máme zamíchaný balíček 32 karet. Vytáhneme postupně dvě karty. Jaká je pravděpodobnost, že

- a) obě karty budou esa?
- b) obě karty budou devítka a desítka (v tomto pořadí)?
- c) obě karty budou devítka a desítka (v libovolném pořadí)?
- d) ani jedna karta nebude král?
- e) obě karty budou stejné barvy?

3.7.3. Kuchař upustil omylem do polévky dva různé prsteny. Všechna polévka byla rozdělena mezi 25 hostů, z toho 8 žen. Jaká je pravděpodobnost, že

- a) oba prsteny dostane jedna osoba?
- b) prsteny budou mít v polévce dva muži?
- c) prsteny nebude mít v polévce žádný muž?
- d) prsteny budou mít v polévce jeden muž a jedna žena?
- e) prsteny budou mít v polévce dvě ženy?
- f) Jak se pravděpodobnosti změní, jestliže prsteny budou stejné?

3.7.4. Hodíme dvěma šestistěnnými kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že větší číslo bude m ?

3.7.5. V šuplíku máme rozházených po 6 ponožkách od každé z barev černá, šedá a bílá. Kolik ponožek musíme průměrně vytáhnout (postupně a poslepu), abychom dostali jednobarevný pář? Nerozlišujeme levou a pravou ponožku.

3.7.6. V šuplíku máme rozházených po p ponožkách od každé z b barev. Kolik ponožek musíme průměrně vytáhnout (postupně a poslepu), abychom dostali jednobarevný pář? Nerozlišujeme levou a pravou ponožku.

3.7.7.* Magnet má dva póly, které se přitahují. Barevné dětské magnetky mají na sobě umělohmotnou čepičku. Čepička zakrývá celý jeden pól magnetu, proto přitahovat se mohou pouze jedním pólem. Magnetky jsou balené po 40 kusech, 10 od každé ze čtyř barev. Předpokládejme, že zakryté póly těchto magnetků jsou zvoleny náhodně s pravděpodobností $\frac{1}{2}$. Jaká je pravděpodobnost, že těchto 40 magnetků lze posporovat do 5×4 stejnobarvených dvojic tak, že každá dvojice se navzájem přitahuje opačnými nezakrytými póly?

3.7.8. Hra *Tic-tac-toe* je hra s tužkou a papírem pro dva hráče X a O, kteří střídavě zapisují křížky a kolečka do čtvercové sítě políček 3×3 , viz Cvičení 2.3.35. Při řešení využijte výsledku Cvičení 2.3.35.

- a) Jaká je střední hodnota počtu tahů do vítězství, jestliže remízy nebudeme uvažovat (předpokládáme, že remíza nemůže nastat). Předpokládejme, že každá hra má stejnou pravděpodobnost (což nemusí být pravda).
- b)* Jaká je střední hodnota počtu tahů do prvního vítězství, jestliže remízy započítáme jako 9 tahů a další hra pokračuje dalším (desátým) tahem. Předpokládejme, že každá hra má stejnou pravděpodobnost (což nemusí být pravda).

3.7.9. Krabice dřevěných dětských vláčků obsahuje jednu lokomotivu a tři vagónky. Vagónky a lokomotiva se spojují pomocí magnetů. Lokomotiva má jeden magnet a každý vagónek má magnety dva – na každém konci jeden. Póly magnetů jsou otočeny tak, aby bylo možno zapojit do vláčku všechny vagónky a to v libovolném pořadí.

- a) S jakou pravděpodobností by se dal sestavit vláček s vagónky v libovolném pořadí, pokud by v továrně orientaci magnetů přiřazovali náhodně?
- b)* Uměli byste předchozí úlohu zobecnit pro n vagónků?
- c) S jakou pravděpodobností by se dal sestavit vláček s vagónky v alespoň jednom pořadí, pokud by v továrně orientaci magnetů přiřazovali náhodně?
- d)* Uměli byste předchozí úlohu zobecnit pro n vagónků?

3.7.10. V balíčku je 8 karet, dvě od každé barvy. Balíček pečlivě rozmícháme. S jakou pravděpodobností dostaneme takové rozmíchání, ve kterém nejsou žádné dvě karty stejné barvy vedle sebe?

3.7.11. Jaký je střední počet hodů šestistennou kostkou než padne každá stěna alespoň jednou?

3.7.12. Čtyřicet sportovců bude rozděleno na čtyři stejně početné skupiny. Jaká je pravděpodobnost, že dva konkrétní sportovci A a B budou ve stejné skupině?

3.7.13. S jakou pravděpodobností bude přijato binární slovo délky 8 znaků, které obsahuje čtyři nuly, jestliže zdroj signálu generuje 7krát více nul než jedniček?

3.7.14. V televizní soutěži se otáčí kolo štěstí. Na kole je 100 oblastí, z toho 60 odpovídá výhře 100 Kč, 30 odpovídá výhře 1000 Kč a 10 oblastí výhře 5000 kč. Jaká je střední hodnota výhry?

3.7.15. Basketbalista hází dvakrát na koš. V prvním hodu trefí koš s pravděpodobností $\frac{7}{10}$. Potom v druhém hodu trefí koš s pravděpodobností $\frac{8}{10}$. Pokud ale v prvním hodu netrefí, tak v druhém hodu uspěje s pravděpodobností jen $\frac{6}{10}$. Jaká je pravděpodobnost, že basketbalista při druhém hodu trefí koš?

4 Další početní postupy

4.1 Motivační příklady

4.1.1. Kolik čísel zůstane v množině čísel $\{1, 2, \dots, 1000\}$ po vyškrtnání všech násobků 2, 3, 5?

4.1.2. Na večírku se sešly 3 manželské páry. Kolika různými způsoby lze posadit těchto 6 lidí kolem kulatého stolu tak, aby manželé neseděli vedle sebe?

4.1.3. Ukažte, že platí

$$\binom{n}{1} + 6\binom{n}{2} + 6\binom{n}{3} = n^3$$

4.2 Princip inkluze a exkluze

Podrobněji si o principu inkluze a exkluze můžete přečíst ve skriptech [ZDM].

4.2.1. Kolik čísel zůstane v množině čísel $\{1, 2, \dots, 1000\}$ po vyškrtnání všech násobků 2, 3, 5, 7?

4.2.2. Kolika způsoby je možno vybrat pět karet z balíčku 52 karet tak, aby mezi nimi byla od každé barvy alespoň jedna karta?

4.2.3. Na večírku se sešly 4 manželské páry. Kolika různými způsoby lze posadit těchto 8 lidí kolem kulatého stolu tak, aby manželé neseděli vedle sebe?

4.2.4.* Na večírku se sešlo n manželských párů. Kolika různými způsoby lze posadit těchto $2n$ lidí kolem kulatého stolu tak, aby manželé *neseděli* vedle sebe? Ve dvou rozdílných rozesazeních má některý člověk jiného souseda po levé nebo po pravé ruce.

4.2.5.* Na plese se sešlo n manželských párů. Kolika různými způsoby může spolu tančit vždy všech $2n$ lidí tak, aby žádný manželský pár netančil spolu?

4.2.6.* (Problém šatnářky) Na shromáždění přišlo n hostů, všichni v kloboucích, a odloží si své klobouky do šatny. Při odchodu dostávají své klobouky náhodně. Jaká pravděpodobnost, že žádný pán nedostane svůj klobouk zpět?

4.2.7. Na shromáždění přišlo 5 hostů, všichni v kloboucích, a odloží si své klobouky do šatny. Při odchodu dostávají své klobouky náhodně. Jaká pravděpodobnost, že žádný pán nedostane svůj klobouk zpět?

4.2.8. Máme dva zamíchané balíčky 32 karet. Z každého obrátíme shora vždy jednu kartu. Jaká je pravděpodobnost, že nikdy nebudou vytaženy dvě stejné karty?

4.2.9. Kolika způsoby rozmístíme r objektů do pěti schránek tak, aby alespoň jedna byla prázdná?

4.2.10. Kolik existuje n prvkových posloupností čísel $0, 1, \dots, 9$ takových, které obsahují vždy čísla 1, 2 a 3? Čísla se mohou opakovat.

4.3 Kombinatorické identity

4.3.1. Upravte výraz $\binom{2n}{n-2} + \binom{2n}{n+3}$ na jediné kombinační číslo.

4.3.2. Upravte výraz $\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \binom{n+2}{2} + \binom{n+3}{3} + \binom{n+4}{4}$ na jediné kombinační číslo.

4.3.3.* Upravte výraz $\sum_{i=0}^k \binom{n+i}{i}$ na jediné kombinační číslo.

4.3.4. Pro jaká n platí $C(n-1, 3) + C(n+2, 3) + 10 = P(n, 3)$?

4.3.5. Ukažte, že platí

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}.$$

4.3.6. Zdůvodněte (kombinatoricky, bez výpočtu kombinačních čísel), že platí

$$\binom{2n}{2} = 2\binom{n}{2} + n^2$$

4.3.7.* Sečtěte $1 + 2\binom{n}{1} + \dots + (k+1)\binom{n}{k} + \dots + (n+1)\binom{n}{n}$.

4.3.8.* Ukažte, že platí

$$\binom{n}{1} + 3\binom{n}{3} + 5\binom{n}{5} + \dots = 2\binom{n}{2} + 4\binom{n}{4} + 6\binom{n}{6} + \dots$$

4.3.9. Vypočítejte

$$1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + (n-2) \cdot (n-1) \cdot n$$

4.3.10. Vypočítejte $\sum_{k=1}^n (k^2 + 1)k!$

4.3.11. Vypočítejte $\sum_{k=1}^n 2^{n-k} k(k+1)!$

4.3.12. Vypočítejte $\sum_{i=0}^k \binom{2n-k}{n-i} \binom{k}{i}$ kde $k \leq n$

4.4 Binomická věta

4.4.1. Kolik sčítanců dostaneme po umocnění trojčlenu $(a+b+c)^7$? Úlohu řešte kombinatorickou úvahou, nikoliv rozepisováním binomického rozvoje.

Pokud roznásobíme všech 7 závorek a sečteme odpovídající členy, bude každý člen obsahovat sedm součinitelů, každý se může opakovat v libovolném počtu kopí (0 až 7). Nebude však hrát roli pořadí, v jakém bylo sedm součinitelů ze tří možností vybráno, proto počet členů je roven počtu kombinací tříprvkové množiny $\{a, b, c\}$ s možností opakování. Existuje celkem $C^*(3, 7) = \binom{7+3-1}{3-1} = \binom{9}{2} = \frac{9 \cdot 8}{2} = 36$ různých členů.

Poznámka:

Obdobně pro druhou mocninu dostaneme známý vztah $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$ se šesti členy, neboť $C^*(3, 2) = \binom{2+3-1}{3-1} = \binom{4}{2} = 6$.

Poznámka:

Pokud rozlišujeme i všechny sčítance se stejnými členy, například členy $a^4b^2c^1$ a $a^3b^2ac^1$ považujeme za různé, tak se jedná o výběr, kdy ze tří součinitelů vybíráme sedmkrát s možností opakování, přičemž rozlišujeme pořadí součinitelů. Takových sčítanců je $V^*(3, 7) = 3^7 = 2187$.

4.4.2. Roznásobíme výraz $(2+x)^{12}$. Jaký koeficient bude

- a) u členu x^5 ?
- b) u členu x^7 ?
- c) u členu x^{10} ?
- d) u členu x^{15} ?

4.5 Důkazy počítáním

4.5.1. Existují na VŠB–TUO dva studenti se stejným posledním čtyřčíslím rodného čísla?

4.5.2. Ukažte, že na Zemi žijí dva lidé se stejným počtem vlasů.

4.5.3. V místnosti je n lidí. Každý z nich má v místnosti několik známých (třeba i žádného). Předpokládáme, že relace „mít známého“ je symetrická. Ukažte, že některí dva lidé mají v místnosti stejný počet známých.

4.5.4. Máte 4 různá čísla od 1 do n ($n \geq 4$). Ukažte, že některá dvě dávají sudý součet. Kolik nejméně čísel zaručí sudý součet?

4.5.5. Máte 4 různá čísla od 1 do n ($n \geq 4$). Ukažte, že na rozdíl od Příkladu 4 nemusí žádná dvě dávat lichý součet.

4.5.6. Máte k různých čísel od 1 do n ($n \geq k \geq 2$). Pro jaké nejmenší k máme zaručeno, že některá dvě dávají lichý součet.

4.5.7. Na čtrnáctidenní dovolenou jelo 20 lidí. Každé odpoledne hrají stolní tenis. U každého ze dvou stolů se hraje postupně šest zápasů, vždy proti sobě hrají dva hráči. Ukažte, že některí dva lidé spolu během celé dovolené nehráli.

4.5.8. V Plzni se v městský dopravních prostředcích štípají lístky. Po Plzni jezdí 150 tramvají, 90 trolejbusů a 120 autobusů. Ukažte, že pokud se štípe vždy 3, 4 nebo 5 políček z devíti, tak musí být v některých vozech stejně kombinace.

4.5.9.* Ukažte, že vyřízneme-li z šachovnice dva protilehlé rohy, potom není možné šachovnici pokrýt dominovými kostkami.

4.5.10.* Ze šachovnice odebereme dvě políčka různé barvy. Ukažte, že je možno pokrýt dominem.

4.5.11. Ukažte, že neexistuje univerzální bezztrátový kompresní algoritmus, tj. taková kompresní funkce, která libovolnou posloupnost n bajtů zkompresuje na posloupnost délky menší než n .

4.6 Příklady k procvičení

4.6.1. Kolik nul na konci má

- a) číslo $50!?$
- b) číslo $1234!?$

4.6.2. Pomocí vhodné kombinatorické interpretace a použitím principu inkluze a exkluze spočítejte nasledující sumu pro n, m, j přirozená taková, že $n \geq j \geq (m+n)$, t.j. vyjádřete tuto sumu jako nějaký výraz, který už bude bez sumy:

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} \binom{m+n-i}{j-i}$$

4.6.3. Dokažte, že platí

$$\binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \binom{r+2}{r} + \cdots + \binom{n-1}{r} + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

4.6.4. Ukažte, že pro libovolných $n+1$ přirozených čísel z množiny $[1, 2n]$ existují taková dvě čísla, že jedno je násobek druhého.

4.6.5. Z aritmetické posloupnosti $1, 4, 7, 10, \dots, 100$ vybereme libovolně 19 členů. Dokažte, že mezi nimi existují dvě čísla, jejichž součet je 104.

4.6.6. Ukažte, že v množině libovolných $k+1$ celých čísel existuje alespoň jedna dvojice čísel, jejichž rozdíl je dělitelný číslem k .

4.6.7. Je daných přirozených 33 čísel, jejichž prvočíselné dělitele jsou z množiny $\{2, 3, 5, 7, 11\}$. Dokažte, že můžeme z nich vybrat dvě taková čísla, že jejich součin je čtverec (druhá mocnina přirozeného čísla).

4.6.8. Mějme 18 libovolných prvočísel. Ukažte, že z nich lze vybrat pět prvočísel tak, že rozdíl každé dvojice vybraných prvočísel je dělitelný pěti.

4.6.9. Házíme k klasickými kostkami současně. Z množiny l lidí, kde $l > \binom{k+5}{5}$, každý hodí všemi k kostkami najednou. Ukažte, že některí lidé hodí stejnou kombinaci ok na kostkách.

4.6.10. mějme šachovnici 6×6 políček. Na šachovnici můžeme 18 dílků domino tak, aby každé políčko šachovnice bylo zakryté. Ukažte, že v jakémkoliv pokrytí bude alespoň jedna vodorovná nebo svislá přímá spára, která dělí šachovnici na dvě části.

5 Rekurentní rovnice

5.1 Motivační příklady

5.1.1. Kolika způsoby můžeme zaplnit šachovnici $2 \times n$ políček, máme-li k dispozici neomezený počet dílků 2×1 a 2×2 políčka?

5.1.2. Znaky Arkadijského písma sestávají vždy jen z jednoho nebo dvou rovných tahů. Pro jednoduchost si můžeme představit, že písmena se skládají z jedné nebo dvou sirek. Existují 3 různé znaky z jedné sirky a 10 různých znaků ze dvou sirek. Kolik různých posloupností Arkadijských znaků můžeme sestavit z n sirek?

5.2 Sestavení rekurentní rovnice

5.2.1. Určete řád rekurentních rovnic.

- a) $a_n = -1.21a_{n-1}$
- b) $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}$
- c) $a_n = a_{n-4}$
- d) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}^2$
- e) $a_n = a_{n-1} \cdot a_{n-3} + 1$
- f) $a_n = a_{n-1} + n$

5.3 Charakteristická rovnice

5.3.1. K dané rekurentní rovnici sestavte charakteristickou rovnici. Najděte všechny její kořeny.

- a) $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$
- b) $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$
- c) $a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - a_{n-3}$
- d) $a_n = a_{n-1} + 8a_{n-2} - 12a_{n-3}$

5.4 Tvar obecného řešení

5.4.1. Sestavte tvar obecného řešení k rekurentním rovnicím ze sekce 5.3.

- a) $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$
- b) $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$
- c) $a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - a_{n-3}$
- d) $a_n = a_{n-1} + 8a_{n-2} - 12a_{n-3}$

5.5 Nalezení obecného řešení

5.5.1. Najděte obecné řešení k rekurentním rovnicím ze sekce 5.4 s danými počátečními podmínkami.

- a) $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ pro $a_0 = 1, a_1 = 6$
- b) $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$ pro $a_0 = 2, a_1 = 5, a_2 = 15$
- c) $a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - a_{n-3}$ pro $a_0 = 1, a_1 = -2, a_2 = -1$
- d) $a_n = a_{n-1} + 8a_{n-2} - 12a_{n-3}$ pro $a_0 = 3, a_1 = -8, a_2 = 56$

5.6 Tvar partikulárního řešení

5.6.1. Sestavte tvar partikulárního řešení k následujícím rekurentním rovnicím.

- a) $a_n = 8a_{n-1} - 16a_{n-2} + (n+1)3^n$
- b) $a_n = 8a_{n-1} - 16a_{n-2} + (2-n)4^n$
- c) $a_n = 7a_{n-1} - 16a_{n-2} + 12a_{n-3} + n^3$
- d) $a_n = 7a_{n-1} - 16a_{n-2} + 12a_{n-3} - 2n4^n$
- e) $a_n = 7a_{n-1} - 16a_{n-2} + 12a_{n-3} - 2n2^n$

5.7 Řešení nehomogenních rekurentních rovnic

5.7.1. Najděte řešení následujících rekurentních rovnic s danými počátečními podmínkami.

- a) $a_n = 8a_{n-1} - 16a_{n-2} + (n+1)3^n$, kde $a_0 = 1$, $a_1 = 10$
- b) $a_n = 8a_{n-1} - 16a_{n-2} + (n+1)3^n$, kde $a_0 = 2$, $a_1 = 5$
- c) $a_n = 8a_{n-1} - 16a_{n-2} + (2-n)4^n$, kde $a_0 = 2$, $a_1 = 6$

5.8 Příklady k procvičení

5.8.1. Do fondu vložíme 100 000 Kč. Podle podmínek fondu bude částka, která byla na účtu v posledním roce, úročena 20% a částka, která byla na účtu v předposledním roce, úročena 45%. Jaká bude částka na účtu v n -tém roce?

5.8.2. Morseova abeceda sestává ze signálů dvou druhů: teček a čárek. Například pomocí 1 signálu můžeme sestavit dvě zprávy, pomocí dvou signálů však již $2 \cdot 2 + 4 = 8$ zpráv.

- čtyři zprávy ze dvou znaků po jednom signálu a
- čtyř znaků po dvou signálech.

Existují 2 znaky po jednom signálu, 4 znaky ze dvou signálů, 8 znaků ze tří signálů a 13 znaků ze čtyř signálů (teoreticky existuje 16 signálů, ale česká abeceda využívá jen 13 z nich). Kolik různých zpráv můžeme sestavit pomocí n signálů? Sestavte rekurentní vztah a s využitím výpočetní techniky najděte obecné řešení s přibližně určenými kořeny na dvě desetinná místa.

5.8.3. Kolika způsoby může Ferdinand vyběhnout n schodů, jestliže může každým krokem vystoupat o jeden nebo o dva schody. Dva způsoby považujeme za různé, jestliže se liší pořadí, kdy Ferdinand udělá krok přes dva schody nebo přes jeden schod.

5.8.4. Budeme lepit ozdobnou řadu kachliček o rozměru $1 \times n$ čtverečků. K dispozici máme

- kachličky čtyř různých barev o rozměru 1×1 čtvereček a
- kachličky pěti různých barev o rozměru 1×2 čtverečky.


Kolika způsoby můžeme vykachličkovat řadu kachliček o rozměru $1 \times n$ čtverečků? Sestavte rekurentní vztah a najděte obecné řešení.

5.8.5. Vyřešte rekurentní rovnici $a_n = a_{n-1} + n$, kde $a_1 = 3$.

6 Modulární aritmetika

6.1 Motivační příklady

6.1.1. Kontrolní schéma čísla bankovních institucí na šeku je $7x_1 + 3x_2 + 9x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 9x_6 + 7x_7 + 3x_8 + 9x_9 \equiv 0 \pmod{10}$. Je číslo 307074580 platný kód?



6.2 Dělitelnost

6.2.1. Mějme dvě celá čísla a, b . Vyjádřete celočíselný podíl a zbytek dle Věty o jednoznačnosti podílu a zbytku jako $a = qb + r$.

- a) $a = 101, b = 9$
- b) $a = 9, b = 101$
- c) $a = -158, b = 11$

6.2.2. Určete zbytek po dělení následujících čísel.

- a) Zbytek po dělení čísla 589 číslem 8
- b) Zbytek po dělení čísla 5 891 číslem 7
- c) Zbytek po dělení čísla 5 891 číslem 11

6.3 Euklidův algoritmus

6.3.1. Použijte Euklidův algoritmus pro nalezení největšího společného dělitele následujících čísel.

- a) 589 a 8
- b) 123 a 277
- c) 1 529 a 14 039

6.4 Bézoutova věta

6.4.1. Použijte Euklidův algoritmus ze sekce 6.3 pro nalezení Bézoutových koeficientů.

- a) Napište NSD(589, 8) jako lineární kombinaci obou čísel.
- b) Napište NSD(123, 277) jako lineární kombinaci obou čísel.
- c) Napište NSD(1 529, 14 039) jako lineární kombinaci obou čísel.

6.4.2. Určete NSD(91, 169) a napište jej jako lineární kombinaci obou čísel.

6.4.3. Najděte inverzi čísla a modulo m .

- a) Najděte inverzi čísla 8 modulo 11.

kód	znak	kód	znak
65	A	78	N
66	B	79	O
67	C	80	P
68	D	81	Q
69	E	82	R
70	F	83	S
71	G	84	T
72	H	85	U
73	I	86	V
74	J	87	W
75	K	88	X
76	L	89	Y
77	M	90	Z

Tabulka 1: část ASCII tabulky.

- b) Najděte inverzi čísla 87 modulo 12.
- c) Najděte inverzi čísla 87 modulo 13.

6.4.4. Najděte inverzi čísla a modulo m .

- a) Najděte inverzi čísla 91 modulo 13.
- b) Najděte inverzi čísla 91 modulo 14.
- c) Najděte inverzi čísla 91 modulo 15.

6.5 Modulární aritmetika

6.5.1. Vypočítejte v příslušné modulární aritmetice

- a) $13 +_{11} 39$
- b) $13 \cdot_{11} 39$
- c) $13 \cdot_4 39$
- d) $(781 +_5 71) \cdot_7 65$

6.5.2. V Tabulce 1 vidíme část ASCII tabulky. Zakódujte slovo „AHOJ“ tak že ASCII kód každého slova vynásobíte číslem 7 modulo 256.

6.5.3. navážeme na Cvičení 2 Dekódujeme slovo určené posloupností (199, 248, 41, 6) tak, že najdeme inverzi čísla 7 module 256 a čísla v posloupnosti vynásobíme module modulo 256.

6.5.4. V Tabulce 1 vidíme část ASCII tabulky. Ukažte, že pokud zakódujeme slovo „AHOJ“ tak že ASCII kód každého slova vynásobíte číslem 12 modulo 256, tak získanou posloupnost čísel nelze dekódovat.

6.5.5. navážeme na Cvičení 2 Dekódujeme slovo určené posloupností (199, 248, 41, 6) tak, že najdeme inverzi čísla 7 module 256 a čísla v posloupnosti vynásobíme module modulo 256.

6.6 Kongruence

6.6.1. Rozhodněte, zda čísla a, b jsou kongruentní modulo m .

- a) Čísla $a = 19, b = 11$ modulo 6
- b) Čísla $a = 19, b = 11$ modulo 4
- c) Čísla $a = 546, b = 141$ modulo 11
- d) Čísla $a = 546, b = 141$ modulo 45

6.6.2. Najděte řešení uvedené lineární kongruence.

- a) $x \equiv 15 \pmod{9}$
- b) $x \equiv -74 \pmod{12}$
- c) $2x \equiv 5 \pmod{10}$
- d) $2x \equiv 6 \pmod{10}$
- e) $2x \equiv 4 \pmod{10}$
- f) $2x \equiv 5 \pmod{9}$
- g) $8x \equiv 5 \pmod{11}$

6.7 Soustavy kongruencí

6.7.1. Vyřešte následující soustavy kongruencí.

- a) $x \equiv 4 \pmod{10}, x \equiv 3 \pmod{17}$
- b) $2x \equiv 4 \pmod{5}, x \equiv 1 \pmod{9}$
- c) $3x \equiv 4 \pmod{6}, x \equiv 1 \pmod{9}$

6.8 Příklady k procvičení

6.8.1. Která čísla dávají zbytek 15 po dělení číslem 8?

6.8.2. Která čísla jsou kongruentní s 15 modulo 8?

6.8.3. Kontrolní schéma UPC kódu je $3x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + x_6 + 3x_7 + x_8 + 3x_9 + x_{10} + 3x_{11} + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}$. Je číslo 793573431042 platný UPC kód?

6.8.4. Kontrolní schéma UPC kódu je $3x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + x_6 + 3x_7 + x_8 + 3x_9 + x_{10} + 3x_{11} + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}$. Je číslo 401305480285 platný UPC kód?

6.8.5. Kontrolní schéma UPC kódu je $3x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + x_6 + 3x_7 + x_8 + 3x_9 + x_{10} + 3x_{11} + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}$. Osmá cifra UPC kódu je znehodnocena 4013054?0285. Určete její hodnotu.

6.8.6. Kontrolní schéma ISBN-10 kódu je $10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 6x_5 + 5x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 2x_9 + 1x_{10} \equiv 0 \pmod{11}$. Je číslo 8072260014 platný ISBN kód?

6.8.7. Kontrolní schéma ISBN-10 kódu je $10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 6x_5 + 5x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 2x_9 + 1x_{10} \equiv 0 \pmod{11}$. Je číslo 0471595047 platný ISBN kód?

6.8.8. Kontrolní schéma ISBN-10 kódu je $10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 6x_5 + 5x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 2x_9 + 1x_{10} \equiv 0 \pmod{11}$. Je číslo 8072261147 platný ISBN kód?

6.8.9. Kontrolní schéma ISBN-10 kódu je $10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 6x_5 + 5x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 2x_9 + 1x_{10} \equiv 0 \pmod{11}$. Poslední cifra ISBN kódu je znehodnocena 807226114?. Určete její hodnotu.

6.8.10. Kontrolní schéma ISBN-10 kódu je $10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 6x_5 + 5x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 2x_9 + 1x_{10} \equiv 0 \pmod{11}$. Najděte kontrolní (poslední) cifru ISBN kódu 013101963?.

6.8.11. Kontrolní schéma ISBN-10 kódu je $10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 6x_5 + 5x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 2x_9 + 1x_{10} \equiv 0 \pmod{11}$. Najděte kontrolní (poslední) cifru ISBN kódu 430736211?.

6.8.12. Kontrolní schéma ISBN-10 kódu je $10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 6x_5 + 5x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 2x_9 + 1x_{10} \equiv 0 \pmod{11}$. Sedmá cifra ISBN kódu je znehodnocena 807226?147. Určete její hodnotu.

6.8.13. Kontrolní schéma ISBN-10 kódu je $10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 6x_5 + 5x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 2x_9 + 1x_{10} \equiv 0 \pmod{11}$. Sedmá cifra ISBN kódu je znehodnocena 807226?227. Určete její hodnotu.


6.8.14. Kontrolní schéma ISBN-10 kódu je $10x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 7x_4 + 6x_5 + 5x_6 + 4x_7 + 3x_8 + 2x_9 + 1x_{10} \equiv 0 \pmod{11}$. Je číslo 8072261147 platný ISBN kód?

6.8.15. Kontrolní schéma čísla bankovních institucí na šeku je $7x_1 + 3x_2 + 9x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 9x_6 + 7x_7 + 3x_8 + 9x_9 \equiv 0 \pmod{10}$. Je číslo 415002204 platný kód?

6.8.16. Kontrolní schéma čísla bankovních institucí na šeku je $7x_1 + 3x_2 + 9x_3 + 7x_4 + 3x_5 + 9x_6 + 7x_7 + 3x_8 + 9x_9 \equiv 0 \pmod{10}$. První cifra kódu je znehodnocena ?06480665. Určete její hodnotu.

Část II

Úvod do teorie grafů



Stavový graf hlavolamu „hanojské věže“.

1 Pojem grafu

Základní grafové pojmy jsou podrobně zavedeny ve skriptech [UTG].

1.1 Motivační příklady

1.1.1. Devět kamarádů si na Vánoce dalo dárky. Každý dal dárky třem svým kamarádům. Ukažte, že není možné, aby každý dostal dárky právě od těch tří kamarádů, kterým dárky sám dal.

1.1.2. Máme 6 házenkářských týmů, které mají odehrát 15 zápasů, každý s každým. Je možné odehrát celý turnaj během pěti hracích dnů, kdy probíhají současně vždy 3 zápasy?

1.1.3. Máme 7 házenkářských týmů, které mají odehrát 21 zápasů, každý s každým. Ukažte, že není možné odehrát celý turnaj během šesti hracích dnů, kdy probíhají současně vždy 3 zápasy.

1.2 Základní trídy grafů

1.2.1. \diamond Nakreslete graf $G = (V, E)$, je-li dáno

- a) $V = \{a, b, c, d\}$ a $E = \{ab, ac, ad\}$.
- b) $V = \{k, l, m, n, o\}$ a $E = \{kl, mn, mo, ln, ko\}$.
- c) $V = \{k, l, m, n, o, p\}$ a $E = \{kl, mn, mp, lo, ok, np\}$.
- d) $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ a $E = \{12, 13, 14, 25, 26, 57, 68\}$

1.2.2. \diamond Kolik hran a kolik vrcholů má P_n (dle značení ve skriptech [UTG])?

1.2.3. \diamond Kolik hran a kolik vrcholů má K_n ?

1.2.4. \diamond Kolik hran a kolik vrcholů má $K_{m,n}$?

1.2.5. \diamond Srovnejme grafy $K_{6,7}$ a K_{10} .

- a) Který má více vrcholů?
- b) Který má více hran?

1.2.6. \diamond Srovnejme grafy $K_{5,12}$ a K_{12} .

- a) Který má více vrcholů?
- b) Který má více hran?

1.2.7. Pro jaké n je K_n cyklem?

1.3 Stupně vrcholů v grafu

1.3.1. Jaký je největší a nejmenší stupeň vrcholu v grafu

- a) P_n
- b) C_n ?
- c) K_n ?
- d) $K_{m,n}$?

1.3.2. \diamond Napište stupňovou posloupnost grafu

- a) P_5 ,
- b) C_4 ,
- c) K_4 ,
- d) $K_{3,2}$.

1.3.3. Kolik existuje různých grafů na n vrcholech. Předpokládejme, že rozlišujeme pojmenování vrcholů, tj. například pro $V = \{1, 2, 3\}$ rozlišíme grafy s $E_1 = \{12\}$ a graf s $E_2 = \{23\}$.

1.3.4. Kolik existuje různých bipartitních grafů na $m + n$ vrcholech. Rozlišujeme pojmenování vrcholů!

1.3.5. Pro jaké n je K_n cestou?

1.3.6. Pro jaké n je $K_{m,n}$ cyklem?


1.3.7. Pro jaké m, n je $K_{m,n}$ cestou?

1.3.8.♡ Kolik hran má graf

- a) s deseti vrcholy stupně 5?
- b) s 11 vrcholy stupně 5?
- c) se stupňovou posloupností $(7, 6, 6, 5, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1)$
- d) se stupňovou posloupností $(7, 6, 6, 5, 3, 3, 2, 1, 1, 1)$
- e) se stupňovou posloupností $(7, 6, 6, 5, 3, 3, 2, 1, 1)$

1.3.9. Kolik vrcholů má graf, který má 15 hran, 3 vrcholy stupně 4 a zbývající vrcholy stupně 3?

1.3.10. Určete stupňovou posloupnost grafu G na Obrázku 1.1. Je to jediný graf s touto stupňovou posloupností?




Obrázek 1.1: Graf G .

1.3.11. Nakreslete graf se stupňovou posloupností

- a)♡ $(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)$
- b) $(5, 2, 2, 1, 1, 1)$
- c) $(4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0)$
- d) $(5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2)$
- e) $(7, 6, 4, 3, 3, 3, 1, 1)$
- f)♡ $(5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$
- g)♡ $(5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$
- h) $(5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$

1.3.12. Najděte velikost největší nezávislé množiny vrcholů v grafu $K_{5,5}$.

1.3.13. Najděte velikost největší nezávislé množiny vrcholů v grafu na Obrázku 1.2.



Obrázek 1.2: *Cirkulant $C_{10}(1, 2, 5)$* .


1.4 Podgrafen

Mějme dána kladná celá čísla a_1, a_2, \dots, a_k . Cirkulantem $C_n(a_1, a_2, \dots, a_k)$ rozumíme graf $G = (V, E)$ na n vrcholech v_0, v_1, \dots, v_{n-1} , kde hranová množina je

$$E = \{v_i v_{(i+a_j) \bmod n} : 0 \leq i \leq n-1 \wedge 1 \leq j \leq k\}.$$


Příklad cirkulantu $C_{10}(1, 2, 5)$ je na Obrázku 1.8.

1.4.1. Mějme graf G na Obrázku 1.3.





Obrázek 1.3: *Graf G* .

- a) \heartsuit Jaký je nejdelší cyklus obsažený jako podgraf v grafu G ?
- b) \heartsuit Jaký je nejkratší cyklus obsažený jako podgraf v grafu G ?
- c) \heartsuit Jaká je nejdelší cesta obsažená jako podgraf v grafu G ?
- d) \heartsuit Jaký je nejkratší indukovaný cyklus v grafu G ?
- e)* Jaký je nejdelší indukovaný cyklus v grafu G ?
- f)* Jaká je nejdelší indukovaná cesta v grafu G ?
- g) Jaká je velikost největší nezávislé množiny vrcholů grafu G ?
- h) Existuje nějaký neisomorfní graf se stejnou stupňovou posloupností?
- i) Ukažte, že graf G'' na Obrázku 1.4 je isomorfní s grafem G .



Obrázek 1.4: Graf G'' se stupňovou posloupností $(4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2)$.

1.4.2. Mějme grafy G a H na Obrázku 1.5.



Obrázek 1.5: Grafy G a H .


- a) Jaká je nejdelší indukovaná cesta v grafu G ?
- b) Jaký je nejdelší indukovaný cyklus v grafu G ?
- c) Jaká je nejdelší indukovaná cesta v grafu H ?
- d) Jaký je nejdelší indukovaný cyklus v grafu H ?

1.5 Isomorfismus grafů

1.5.1. Kolik existuje neisomorfních 2-pravidelných grafů

- a) na 5 vrcholech?
- b) na 6 vrcholech?

1.5.2. Jsou isomorfní grafy $K_7 - C_7$ a $K_7 - (C_3 \cup C_4)$?




Obrázek 1.6: Grafy $K_7 - C_7$ a $K_7 - (C_3 \cup C_4)$.

1.5.3. Jsou následující dva grafy G a H isomorfní?



Obrázek 1.7: Grafy G a H .

1.5.4. Jsou isomorfní $K_{5,5}$ a cirkulant $C_{10}(1, 2, 5)$ na Obrázku 1.8?




Obrázek 1.8: Komplettní bipartitní graf $K_{5,5}$ a cirkulant $C_{10}(1, 2, 5)$.

1.5.5. Kolik existuje neisomorfních 5-pravidelných grafů na osmi vrcholech?

1.5.6. Existují dva neisomorfní grafy se stupňovou posloupností

- a) $(3, 3, 3, 3, 3, 3)$? Najděte je nebo ukažte, že takové grafy neexistují.
- b) $(3, 3, 2, 2)$? Najděte je nebo ukažte, že takové grafy neexistují.

1.5.7. Najděte mezi grafy G_1 , G_2 , G_3 a G_4 na Obrázku 1.9 všechny isomorfní dvojice. Pečlivě zdůvodněte.

Obrázek 1.9: Grafy označené po řadě G_1 , G_2 , G_3 a G_4 .

1.5.8. Najděte všechny neisomorfní jednoduché grafy na čtyřech vrcholech.

1.6 Implementace grafů

1.6.1.* Naprogramujte algoritmus, jak rozmístit 8 královen na šachovnici tak, aby se navzájem neohrožovaly.

1.6.2. Naprogramujte algoritmus, který vygeneruje všechny grafy na n vrcholech, jestliže rozlišujeme pojmenování vrcholů, tj. například pro $V = \{1, 2, 3\}$ rozlišíme grafy s $E_1 = \{12\}$ a s $E_2 = \{23\}$.

1.7 Příklady k procvičení

1.7.1. \heartsuit Srovnejme grafy $K_{6,6}$ a K_9 .

- a) Který má více vrcholů?
- b) Který má více hran?

1.7.2. Srovnejme grafy $K_{20,20}$ a K_{29} .

- a) Který má více vrcholů?
- b) Který má více hran?

1.7.3. Kolik hran a kolik vrcholů má C_n ?


1.7.4. Pro jaké m, n neobsahuje $K_{m,n}$ žádný cyklus?

1.7.5. \heartsuit Kolik hran musíme odebrat z grafu K_6 , abychom dostali $K_{3,3}$?

1.7.6. Pro která n je následující stupňová posloupnost grafová?

- a) $(n, n-1, \dots, 1)$
- b) $(n-1, n-2, \dots, 0)$
- c) $(n, n, n-n, n-1, n-2, n-2, \dots, 1, 1)$

- 1.7.7. Pro které hodnoty n a r existuje grafu na n vrcholech, kde každý vrchol je stupně r ? Dokažte.
- 1.7.8. Jsou grafy $K_{3,3}$ a cirkulant $C_6(1,3)$ isomorfní?
- 1.7.9. Jsou grafy $K_{4,4}$ a cirkulant $C_8(1,2)$ isomorfní?
- 1.7.10. Jsou následující dva grafy G a H isomorfní?



Obrázek 1.10: Grafy G a H .

- 1.7.11.* Na jakém nejmenším počtu vrcholů najdete dva neisomorfní grafy se stejnou stupňovou posloupností?
- 1.7.12.* Strnulý graf má pouze triviální automorfismus. Najděte strnulý graf s co nejmenším počtem vrcholů.
- 1.7.13. Kolik existuje grafů se sedmi vrcholy stupně 2?
- 1.7.14. Kolik existuje grafů s deseti vrcholy stupně 2?

2 Souvislost grafu


Souvislost grafu je zavedena ve skriptech [UTG].

2.1 Souvislost a komponenty grafu

2.1.1. \heartsuit Kolik komponent souvislosti má souvislý graf?


2.1.2. \heartsuit Kolik komponent souvislosti má nesouvislý graf?

2.1.3. \heartsuit Kolik komponent souvislosti má graf na Obrázku 2.1? Je souvislý?




Obrázek 2.1: *Graf G.*

2.1.4. Kolik komponent souvislosti má graf G na Obrázku 2.2? Je souvislý?



Obrázek 2.2: *Graf G.*

2.1.5. \heartsuit Kolik komponent souvislosti má graf na Obrázku 2.3? Je souvislý?



Obrázek 2.3: *Graf G.*

2.1.6. Kolik komponent souvislosti má cirkulant $C_{12}(3, 6)$?

2.1.7. Kolik komponent má graf s deseti vrcholy stupně 5? Dokažte.

2.1.8. Kolik komponent může mít graf s deseti vrcholy a 25 hranami? Dokažte.

2.1.9. Kolik existuje různých grafů s deseti vrcholy, třemi komponentami a 25 hranami? Dokažte.

2.1.10. \heartsuit Kolik komponent má graf s patnácti vrcholy stupně 5? Dokažte.

2.1.11. Kolik komponent může mít graf s deseti vrcholy stupně 2? Dokažte.

2.1.12. Kolik nejvýše hran může mít graf na deseti vrcholech, který má dvě komponenty? Najdete takový graf?

2.1.13. Kolik nejvýše hran může mít graf na deseti vrcholech, který má dvě komponenty a žádný vrchol stupně většího než 3? Najdete takový graf?

2.1.14. Kolik nejméně hran může mít graf na deseti vrcholech, který má dvě komponenty?

2.1.15. Kolik nejméně hran může mít graf na n vrcholech, který má k komponenty?

2.2 Prohledávání grafu

2.2.1. Jaká je složitost algoritmu (uvedeného na přednášce) pro prohledávání do šířky?

2.2.2. Jaká je složitost algoritmu (uvedeného na přednášce) pro prohledávání do hloubky?

2.3 Vyšší stupně souvislosti

2.3.1. Mějme kompletní bipartitní graf $K_{m,n}$.

- a) Jaký je hranový stupeň souvislosti $K_{m,n}$?
- b) Jaký je vrcholový stupeň souvislosti $K_{m,n}$?


2.3.2. Mějme cyklus C_n .

- a) Jaký je hranový stupeň souvislosti C_n ?
- b) Jaký je vrcholový stupeň souvislosti C_n ?

2.3.3. ♦ Víte, že minimální stupeň grafu G je 5.

- a) Co můžete říci o hranové souvislosti grafu G ?
- b) Co můžete říci o vrcholové souvislosti grafu G ?

2.3.4. Máme dán graf $K_{3,3}$ bez jedné hrany, viz Obrázek 2.4.



Obrázek 2.4: Graf $K_{3,3} - e$.

- a) Kolik hran musíme z grafu vynechat, aby neexistovala cesta mezi vrcholy a, b ? Zdůvodněte!
- b) Kolik hran musíme z grafu vynechat, aby neexistovala cesta mezi vrcholy x, y ? Zdůvodněte!

2.3.5. ♦ Kolik musíme přidat hran do grafu P_5 , aby byl 2-souvislý?

2.3.6. Kolik musíme přidat hran do grafu P_6 , aby byl 3-souvislý?

2.3.7. Najděte příklad grafu, kde každý vrchol je stupně r a hranová i vrcholová souvislost je 1.

2.3.8. Najděte příklad grafu, kde každý vrchol je stupně r a hranová i vrcholová souvislost je 2.

2.3.9. Najděte příklad grafu, kde každý vrchol je stupně r a hranová i vrcholová souvislost je $k \leq r$.

2.3.10. Mějme libovolná přirozená čísla $a \leq b \leq c$. Najděte příklad grafu, kde každý vrchol je stupně c a hranová souvislost je b a vrcholová souvislost je a .

- 2.3.11. Najděte příklad souvislého grafu, jehož vrcholová souvislost je menší než hranová souvislost.
- 2.3.12. Najděte příklad souvislého grafu, jehož hranová souvislost je menší než vrcholová souvislost.
- 2.3.13. Nakreslete 2-souvislý graf na co nejmenším počtu vrcholů tak, aby z něj přidáním jediné hrany vznikl 3-souvislý graf.
- 2.3.14.* Dokážete nakreslit 2-souvislý graf na co nejmenším počtu vrcholů a nejvýše dvěma vrcholy stupně dva tak, že přidáním jediné hrany nevznikne 3-souvislý graf?

2.4 Příklady k procvičení

2.4.1.[◊] Může existovat souvislý graf, který má více vrcholů než hran? Pokud ano, najděte příklad, pokud ne, dokažte.

2.4.2. Najděte všechny souvislé grafy, které mají více vrcholů než hran.

2.4.3. Může existovat souvislý graf, který má n vrcholů a méně než $n - 1$ hran? Pokud ano, najděte příklad, pokud ne, dokažte.

2.4.4. Ukažte, že není možné putovat koněm po celé šachovnici 3×3 .

2.4.5. Kolik nejvíce hran může mít graf s $n \geq 2$ vrcholy a 2 komponentami?

2.4.6.* Kolik nejvíce hran může mít graf s n vrcholy a k komponentami? Předpokládáme, že $k \leq n$.

2.4.7. Kolik nejméně hran musí mít 3-souvislý graf

- a) na 6 vrcholech?
- b) na 12 vrcholech?
- c) na 9 vrcholech?

2.4.8. Definujme graf $Z_2(n)$ jako graf, jehož vrcholy jsou všechny dvouprvkové podmnožiny nějaké n prvkové množiny, $n \geq 2$. Dva vrcholy jsou sousední, jestliže odpovídající vrcholy jsou disjunktní.

- a) Pro která n je graf $Z_2(n)$ souvislý?
- b) Je graf $Z_2(n)$ pravidelný?
- c) Jaký je stupeň souvislosti grafu $Z_2(n)$?

2.4.9. Definujme graf $Z_2^*(n)$ jako graf, jehož vrcholy jsou všechny dvouprvkové podmnožiny nějaké n prvkové množiny, $n \geq 2$. Dva vrcholy jsou sousední, jestliže odpovídající vrcholy nejsou disjunktní.

- a) Pro která n je graf $Z_2^*(n)$ souvislý?
- b) Je graf $Z_2^*(n)$ pravidelný?
- c) Jaký je stupeň souvislosti grafu $Z_2^*(n)$?

2.4.10.* Na množině čtyř vrcholů konstruujeme náhodný jednoduchý neorientovaný graf (bez smyček) tak, že každou dvojici vrcholů spojíme hranou s pravděpodobností p . Určete pravděpodobnost, že výsledný graf bude obsahovat a) alespoň jeden izolovaný vrchol, b) alespoň jeden trojúhelník.

2.4.11. Pat a Mat hrají hru: Mají daný souvislý graf G a bud' Pat odstraní p vrcholů nebo Mat odstraní m hran. Kdo odstraní méně objektů (vrcholů nebo hran), vyhrál. Kdo vyhraje, jestliže

- a) $G = P_n$?
- b) $G = K_n$?
- c) $G = C_n$?
- d) $G = K_{m,n}$?


2.4.12. Mějme přirozené číslo $n \neq 2$. Ukažte, že cirkulant $C_{2n}(1, n)$ je 3-souvislý.

3 Eulerovské a hamiltonovské grafy

Eulerovské a hamiltonovské grafy jsou zavedeny ve skriptech [UTG].


3.1 Eulerovské grafy

3.1.1. Je graf na Obrázku 3.1 eulerovský? Pokud ano, najděte uzavřený eulerovský tah.




Obrázek 3.1: *Graf G.*

3.1.2. Je graf na Obrázku 3.2 eulerovský? Pokud ano, najděte uzavřený eulerovský tah.




Obrázek 3.2: *Graf G.*

3.1.3. Je graf na Obrázku 3.3 eulerovský? Pokud ano, najděte uzavřený eulerovský tah.



Obrázek 3.3: *Graf G.*

3.1.4. Máme dán graf $K_{3,3}$ bez jedné hrany, viz Obrázek 3.4.



Obrázek 3.4: *Graf $K_{3,3} - e$.*

- a) Je možno graf $K_{3,3} - e$ nakreslit jedním uzavřeným tahem? Nakreslete nebo zdůvodněte, proč to není možné.
- b) Je možno graf $K_{3,3} - e$ nakreslit jedním otevřeným tahem? Nakreslete nebo zdůvodněte, proč to není možné.
- c) Je možno graf $K_{3,3} - e$ nakreslit dvěma otevřenými tahy? Nakreslete nebo zdůvodněte, proč to není možné.
- d) Kolik nejméně hran je třeba přidat do grafu $K_{3,3} - e$, aby jej bylo možno nakreslit jedním otevřeným tahem?
- e) Kolik nejméně hran je třeba přidat do grafu $K_{3,3} - e$, aby jej bylo možno nakreslit jedním uzavřeným tahem?

3.1.5. Je cirkulant $C_6(1, 2)$ s vrcholovou množinou $V = \{v_i : i = 1, 2, \dots, 6\}$ eulerovský? Pokud ano, najděte uzavřený eulerovský tah.

3.1.6. Je cirkulant $C_6(1, 3)$ s vrcholovou množinou $V = \{v_i : i = 1, 2, \dots, 6\}$ eulerovský? Pokud ano, najděte uzavřený eulerovský tah.

3.1.7. Je cirkulant $C_8(1, 2)$ s vrcholovou množinou $V = \{v_i : i = 1, 2, \dots, 8\}$ eulerovský? Pokud ano, najděte uzavřený eulerovský tah.

3.1.8. \diamond Pro která n je možno K_n nakreslit jedním uzavřeným tahem?

3.1.9. Pro která n je možno K_n nakreslit jedním otevřeným a nikoli uzavřeným tahem?

3.1.10. Pro která m, n je možno $K_{m,n}$ nakreslit jedním uzavřeným tahem?

3.1.11. Pro která n je možno $K_{m,n}$ nakreslit jedním otevřeným tahem?

3.1.12. Dokažte, že eulerovský graf neobsahuje most.

3.1.13. Klasické domino obsahuje kostky s čísly 0 až 6. Z kostek je možno sestavit uzavřený cyklus, kdy kostky na sebe navazují stejnou hodnotou.

- a) Vysvětlete, proč tomu tak je, s využitím teorie grafů?
- b) Je možno podobně sestavit cyklus pro domino s čísly 0 až 9?

3.1.14. Ukažte, že pro nesouvislé grafy nemusí platit, že graf s $2t$ vrcholy lichého stupně je možno nakreslit t otevřenými eulerovskými tahy.

3.2 Hamiltonovské grafy

3.2.1. Nechť $V(G)$ grafu G je množina všech dvouprvkových podmnožin množiny $[1, 5]$ a nechť hrana $XY \in E(G)$ právě tehdy, když jsou dvouprvkové podmnožiny X, Y disjunktní ($X \cap Y = \emptyset$). Nakreslete graf.

3.2.2. Je Petersenův graf hamiltonovský? Své tvrzení dokažte.

3.3 Příklady k procvičení

3.3.1. Je graf $K_{4,4}$ eulerovský? Pokud ano, najděte uzavřený eulerovský tah.

3.3.2. Je graf $K_{4,6}$ eulerovský? Pokud ano, najděte uzavřený eulerovský tah.

3.3.3. Pro které n je graf $K_{2,n}$ eulerovský? Pokud ano, najděte uzavřený eulerovský tah.

3.3.4. Najděte příklad souvislého grafu, který má dva vrcholy lichého stupně a všechny ostatní vrcholy sudého stupně a do kterého


- a) stačí přidat jedinou hranu tak, aby byl eulerovský. Jaký je nejmenší takový graf?
- b) není možné přidat jedinou hranu tak, aby byl eulerovský. Jaký je nejmenší takový graf?

3.3.5. Pro každé t najděte příklad souvislého grafu, který

- a) je souvislý, obsahuje $2t$ vrcholů lichého stupně a je možno jej nakreslit t otevřenými tahy.
- b) není souvislý, obsahuje $2t$ vrcholů lichého stupně a je možno jej nakreslit t otevřenými tahy.
- c) je souvislý, obsahuje $2t$ vrcholů lichého stupně a je možno jej nakreslit t otevřenými tahy, ale není možné přidáním t hran získat eulerovský graf.
- d)* je souvislý, obsahuje $2t$ vrcholů lichého stupně a je možno jej nakreslit t otevřenými tahy, a přidáním t hran je možné získat eulerovský graf..

3.3.6. Pro libovolné sudé r a libovolné $n > r$ najděte příklad r -pravidelného eulerovského grafu na n vrcholech.

3.3.7. Máme dán graf G na Obrázku 3.5.



Obrázek 3.5: *Graf G.*

- a) Je graf G eulerovský?
- b) Jak přidat hrany pouze mezi vrcholy v množině U nebo pouze mezi vrcholy v množině W tak, aby vznikl eulerovský graf? Pokud to není možné, dokažte!
- c) Jestliže dovolíme, aby alespoň jedna přidaná hrana měla jeden koncový vrchol v množině U a druhý v množině W , může přidáním hran vzniknout eulerovský graf? Jestliže ano, kolik nejméně hran je třeba přidat? Pokud to není možné, dokažte!

3.3.8. Ukažte, že souvislý graf s $2t$ vrcholy lichého stupně je možno nakreslit t otevřenými eulerovskými tahy.

4 Vzdálenost a metrika v grafu

Pojem vzdálenosti v grafu je popsán ve skriptech [UTG].

4.1 Motivační příklady

4.1.1.* Hlavolam známý jako „Hanojské věže“¹ má tři kolíky a sadu osmi disků různých velikostí. Na začátku je všech osm disků seřazeno podle velikosti na prvním kůlu. Úkolem je přemístit všechny disky na jiný kůl za dodržení následujících podmínek:

1. vždy se přesunuje pouze jeden disk,
2. nikdy nesmí ležet větší disk na menším.

Namodelujte úlohu užitím grafu a pro tři disky najděte nejkratší možné řešení.

4.1.2. Máme osmi litrovou nádobu s vínem a dvě prázdné nádoby – pětilitrovou a třilitrovou. Rozdělte osm litrů na čtyři a čtyři litry jen s užitím těchto nádob, bez použití odměrky. Úloha namodelujte grafem a najděte nejkratší řešení a popište všechna přípustná řešení.

4.1.3. Máme osmi litrovou nádobu s vínem a dvě prázdné nádoby – pětilitrovou a třilitrovou. Je možno odměřit libovolné (celočíselné) množství vína? Pokud ne, zjistěte jaké. Pokud ano, dokažte.

4.2 Vzdálenost v grafu


4.2.1.[◊] Jaká je největší možná vzdálenost dvou vrcholů v grafu K_4 ?

4.2.2.[◊] Jaká je největší možná vzdálenost dvou vrcholů v grafu K_1 ?

4.2.3.[◊] Jaká je největší možná vzdálenost dvou vrcholů v grafu C_7 ?

4.2.4.[◊] Jaká je největší možná vzdálenost dvou vrcholů v grafu $K_{7,8}$?

4.2.5. Jaká je největší možná vzdálenost dvou vrcholů v grafu G na Obrázku 4.1?



Obrázek 4.1: Graf G .

4.2.6. Jaká je největší možná vzdálenost dvou vrcholů v grafu K_n ?

4.2.7.[◊] Jaká je největší možná vzdálenost dvou různých vrcholů v grafu P_n ?

4.2.8. Jaká je největší možná vzdálenost dvou různých vrcholů v grafu $K_{m,n}$?

4.2.9. Jaká je největší možná vzdálenost dvou různých vrcholů v grafu C_n ?

4.2.10. Najděte příklad grafu na osmi vrcholech, ve kterém je minimální i maximální vzdálenost dvou různých nesousedních vrcholů 2.

4.2.11. Najděte graf s co nejmenším počtem hran na osmi vrcholech, ve kterém je minimální i maximální vzdálenost dvou různých nesousedních vrcholů 2.


4.2.12. Najděte graf s co největším počtem hran na osmi vrcholech, ve kterém je minimální i maximální vzdálenost dvou různých nesousedních vrcholů 2.

¹Hanojské věže vymyslel v roce 1883 Francouzský matematik Édouard Lucas.

4.2.13. Najděte graf s co největším počtem vrcholů, ve kterém je maximální vzdálenost dvou různých nesousedních vrcholů 2 a nejvyšší stupeň vrcholu je 3.

4.2.14. Jaká je největší možná vzdálenost dvou vrcholů v grafu W_n ?


4.2.15. Vypočítejte metriku (matici udávající vzdálenosti mezi vrcholy) grafu $K_4 - e$ na Obrázku 4.2.



Obrázek 4.2: Graf K_4 bez jedné hrany.


4.3 Vzdálenost v ohodnocených grafech

4.3.1. Máme dán graf G na Obrázku 4.3. Jaká je největší možná vážená vzdálenost mezi vrcholy v grafu G ?



Obrázek 4.3: Graf G .

4.3.2. Máme dán graf G na Obrázku 4.4. Jaká je největší možná vážená vzdálenost mezi vrcholy v grafu G ?




Obrázek 4.4: Graf G .

4.3.3. Jaká největší možná vážená vzdálenost může být mezi dvěma vrcholy v cyklu délky 9, který je ohodnocený všemi čísly $1, 2, \dots, 9$, každým právě na jedné hraně v libovolném pořadí.

4.4 Nejkratší cesta v ohodnoceném grafu – Dijkstrův algoritmus

4.4.1. Máme dán graf jako na Obrázku 4.5.



Obrázek 4.5: Graf G .

- a) Jaké jsou vzdálenosti všech vrcholů od vrcholu v_1 ?
- b) V jakém pořadí budou zpracovány vrcholy při běhu Dijkstrova algoritmu s výchozím vrcholem v_1 ?
- c) Jaké jsou vzdálenosti všech vrcholů od vrcholu v_3 ?
- d) V jakém pořadí budou zpracovány vrcholy při běhu Dijkstrova algoritmu s výchozím vrcholem v_3 ?
- e) Jaké jsou vzdálenosti všech vrcholů od vrcholu v_5 ?
- f) V jakém pořadí budou objeveny vrcholy při běhu Dijkstrova algoritmu s výchozím vrcholem v_5 ?
- g) Které dva vrcholy jsou nejvzdálenější? Jaká je jejich vzdálenost?
- h) Ze kterého vrcholu je maximální vzdálenost do všech ostatních vrcholů nejmenší?

4.4.2. Ve kterém místě selže Dijkstrův algoritmus, jestliže připustíme i záporná ohodnocení hran?

4.5 Příklady k procvičení

Hyperkrychlí rádu n budeme rozumět takový graf $G(V, E)$ na 2^n vrcholech, jehož vrcholovou množinu tvoří všechny binární vektory délky n

$$V = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

a hrana je mezi každými dvěma vrcholy, jejichž vektory se liší v jediné souřadnici

$$E = \{(a_1, a_2, \dots, a_n)(b_1, b_2, \dots, b_n) : (a_1, a_2, \dots, a_n), (b_1, b_2, \dots, b_n) \in V \wedge \sum_{i=1}^n |a_i - b_i| = 1\}.$$

Hyperkrychle rádu n se značí Q_n .

4.5.1. Mějme graf Q_3 (hyperkrychle rádu 3). Kolik nejméně hran musíme přidat, aby největší možná vzdálenost mezi vrcholy grafu byla 2?

4.5.2. [◊] Jaká je největší možná vzdálenost dvou vrcholů v grafu Q_n ? Dokažte

4.5.3.* Jak převést úlohu hledání nejkratší cesty i pro grafy s ohodnocenými vrcholy?

4.5.4. Kolik nejvíce vrcholů může mít graf, který má největší možnou vzdálenost mezi dvěma vrcholy rovnou 2?

4.5.5. Kolik nejvíce vrcholů může mít 3-pravidelný graf, který má největší možnou vzdálenost mezi dvěma vrcholy rovnou 2? Nakreslete příklad takového grafu.

4.5.6. V jednom okrese je 15 velkých měst a každé město je spojeno silnicí s alespoň sedmi jinými.

- a) Dokažte, že z libovolného města do libovolného jiného se dá dostat buď přímou cestou nebo přes jedno jiné město.
- b) Jak by se úloha změnila, kdyby každé město mělo být spojeno silnicí s právě sedmi jinými?

4.5.7. Mějme graf G , ve kterém je každý vrchol stupně 4. a) Vypočítejte, jaký je nejmenší možný počet vrcholů v grafu G , které jsou od nějakého pevně zvoleného vrcholu ve vzdálenosti 3. Najděte příklad takového grafu. b) Vypočítejte, jaký je největší možný počet vrcholů v grafu G , které jsou od nějakého pevně zvoleného vrcholu ve vzdálenosti 3. Najděte příklad takového grafu.

5 Stromy

Stromy a jejich základní vlastnosti jsou popsány ve skriptech [UTG].

5.1 Motivační příklady

5.1.1. Můžeme algoritmus hledání centra použít i pro jiné grafy než stromy? Najdete alespoň jeden takový graf? Vysvětlete!


5.2 Základní vlastnosti stromů

5.2.1. Kolik neisomorfních lesů existuje na čtyřech vrcholech?

5.2.2. Kolik neisomorfních stromů existuje na pěti vrcholech?


5.2.3. ♦ Najděte centra následujících stromů.

a) Strom T na Obrázku 5.1.




Obrázek 5.1: Strom T .

b) Strom T na Obrázku 5.2.



Obrázek 5.2: Strom T .

c) Strom T na Obrázku 5.3.



Obrázek 5.3: Strom T .

5.2.4. Najděte takový graf se dvěma kružnicemi, že vynecháním jediné hrany vznikne strom.

5.2.5. Kolik hran je třeba vynechat z kompletního grafu K_n , aby zůstala kostra?

5.2.6. Máme dán strom se 17 vrcholy.

a) Kolik odebereme vrcholů (dle algoritmu z přednášky), než najdeme centrum?

b) Kolik nejméně nastane takových kroků, kdy odstraňujeme listy?

c) Kolik nejvíce nastane takových kroků, kdy odstraňujeme listy?

5.2.7. ♦ Máme dán strom se 4 vrcholy. Kolik odebereme vrcholů (dle algoritmu z přednášky), než najdeme centrum?

5.2.8. ♦ Strom má 56 hran. Kolik může mít vrcholů?

5.2.9. Acyklický graf má 70 vrcholů a 60 hran. Kolik má komponent?

5.2.10. Acyklický graf má 60 vrcholů a 70 hran. Kolik má komponent?

5.2.11. ♦ Najděte graf se dvěma kružnicemi, ze kterého vynecháním dvou hran vznikne strom.


5.2.12. Najděte graf se dvěma kružnicemi, ze kterého vynecháním tří hran vznikne strom.

5.2.13. Najděte graf se třemi kružnicemi, ze kterého vynecháním tří hran vznikne strom.

5.2.14. Najděte graf se třemi kružnicemi, ze kterého vynecháním dvou hran vznikne strom.


5.3 Kořenové a pěstované stromy

5.3.1. Najděte a zapište kód kořenového stromu (T, r) na Obrázku 5.4.




Obrázek 5.4: Kořenový strom (T, r) .

5.3.2. Najděte a zapište kód kořenového stromu (T, r) na Obrázku 5.5.




Obrázek 5.5: Kořenový strom (T, r) .

5.3.3. Najděte a zapište kód kořenového stromu (T, r) na Obrázku 5.6.




Obrázek 5.6: Kořenový strom (T, r) .

5.3.4. Najděte a zapište kód kořenového stromu (T, s) na Obrázku 5.7.



Obrázek 5.7: Kořenový strom (T, s) .

5.3.5. Máme dán strom T na Obrázku 5.8.



Obrázek 5.8: Strom T , vyznačené vrcholy r, s .

- a) Najděte a zapište kód kořenového stromu (T, r) .
- b) Najděte a zapište minimální kód kořenového stromu (T, r) .
- c) Najděte a zapište kód kořenového stromu (T, s) .
- d) Najděte a zapište minimální kód kořenového stromu (T, s) .

5.3.6. Nakreslete pěstovaný kořenový strom daný následujícím kódem.

- a) 000000000111111111
- b) 00010110010110010111
- c) 000010110100111000110111
- d) 00001011010011100011011
- e) 000010110110011100011011

5.3.7. Je kód pěstovaného kořenového stromu daného následujícím kódem minimální?


- a) 00000000011111111.
- b) 00010110010110010111
- c) 000110010110010010111
- d) 00010110011001010111
- e) 0000110110110001010111
- f) 000010110100111000110111

5.4 Isomorfismus stromů

5.4.1. Kolik existuje neisomorfních lesů na pěti vrcholech?


5.4.2. Které kořenové stromy mají jednoznačně určený kód i když nejsou pěstované?

5.4.3. Rozhodněte, které z následujících stromů na Obrázku 5.9 jsou isomorfní.

Obrázek 5.9: Stromy T , S a R .


5.5 Kostry grafů

5.5.1. Kolik koster má následující graf W_4 ? Předpokládejme, že rozlišujeme vrcholy.



Obrázek 5.10: Graf W_4 .

5.5.2. Máme dán graf G na Obrázku 5.11.



Obrázek 5.11: *Graf G.*

- a) Najděte minimální kostru grafu G pomocí Kruskalova (hladového) algoritmu. Jaká je váha minimální kostry?
 - b) Najděte minimální kostru grafu G pomocí Jarníkova (Primova) algoritmu. Výchozí vrchol je v_1 . Jaká je váha minimální kostry?
 - c) Najděte minimální kostru grafu G pomocí Borůvkova algoritmu. Jaká je váha minimální kostry?

5.5.3. Jaké vlastnosti musí mít ohodnocení grafu, aby všechny tři algoritmy (Borůvkův, Jarníkův/Primův i Kruskalův (hladový) našly vždy stejnou kostru?

5.5.4. Mějme dán kompletní graf K_n , jehož množina vrcholů je $V = [1, n]$. Každou hranu uv ohodnotíme součtem $u + v$. Jak vypadá minimální kostra takto ohodnoceného kompletního grafu?

5.5.5. Mějme dán kompletní graf K_n , jehož množina vrcholů je $V = [1, n]$. Každou hranu uv ohodnotíme součtem $2u + 5v$, kde $u < v$. Jak vypadá minimální kostra takto ohodnoceného kompletního grafu?

5.6 Příklady k procvičení

5.6.1. Kolik různých koster má cyklus C_n ? Předpokládejme, že rozlišujeme vrcholy.

5.6.2^o Kolik různých neisomorfních koster má cyklus C_n ? Předpokládejme, že nerozlišujeme vrcholy.

5.6.3 Máme graf K_4

- a) Kolik různých neisomorfních koster má graf K_4 ?
 b) Kolik různých koster má graf K_4 ?

5.6.4 Máme graf K_5

- a) Kolik různých koster má graf K_5 ?

b) Kolik různých neisomorfních koster má graf K_5 ?

5.6.5. Máme graf K_6 .

- a) Kolik různých koster má graf K_6 ?
- b) Kolik různých neisomorfních koster má graf K_6 ?

5.6.6. Kolik hran je třeba vynechat z kompletního bipartitního grafu $K_{m,n}$, aby zůstala kostra?

5.6.7. Kolik nejméně vrcholů musí mít graf, který má dvě hranově disjunktní kostry? Najdete takový graf?

5.6.8. Najdete příklad souvislého grafu, který má 1001 koster.

5.6.9. Zavedeme pojem inverzního kódu. Máme strom T a nějaký jeho kód C . Inverzní kód C' dostaneme tak, že zaměníme 0 a 1 a napíšeme kód v opačném pořadí. Najděte takový netriviální strom T , který má

- a) stejný kód i inverzní kód,
- b) různý kód a inverzní kód, přičemž strom T' příslušný inverznímu kódu je isomorfní se stromem T ,
- c) různý kód a inverzní kód, přičemž strom T' příslušný inverznímu kódu není isomorfní se stromem T ,
- d) inverzní kód stejný jako minimální kód.

5.6.10. Máme strom T a jeho kód C . Cestou ve stromu T budeme rozumímat podgraf, který je isomorfní s cestou. Co můžeme říci o nejdelší cestě ve stromu T , je-li v kódu C pět po sobě jdoucích nul?

5.6.11. Máme strom T a jeho *minimální* kód C . Cestou ve stromu T budeme rozumímat podgraf, který je isomorfní s cestou. Co můžeme říci o nejdelší cestě ve stromu T , je-li v kódu C pět po sobě jdoucích nul?


6 Barevnost a kreslení grafů

Pojmy barevnosti grafu a rovinného zakreslení grafu jsou popsány ve skriptech [UTG].

6.1 Motivační příklady

6.1.1. Skladovací problém: Ve skladu potravin máme různé druhy zboží. Podle hygienických norem se nesmí některé druhy potravin skladovat spolu v jedné místnosti. Naším úkolem je zjistit, kolik nejméně místností je potřeba ve skladu pronajmout, aby bylo zboží uloženo podle předpisů. Jak namodelujete skladovací problém pomocí teorie grafů?


6.1.2. Kolik nejméně barev je potřeba na obarvení 15 biliárových koulí v trojúhelníkovém postavení tak, aby žádné dvě dotýkající se koule nebyly obarveny stejnou barvou?



Obrázek 6.1: Biliárové koule v trojúhelníkovém postavení.

6.2 Vrcholové barvení grafů


6.2.1. Jaké je chromatické číslo (barevnost) následujících grafů?



Obrázek 6.2: Grafy W_8 a W_7 .

a) Graf W_8 , viz Obrázek 6.2?

b) Graf W_7 , viz Obrázek 6.2?




Obrázek 6.3: Rovinná nakreslení pravidelného čtyřstěnu, šestistěnu a osmistěnu.

c) Graf pravidelného čtyřstěnu, viz Obrázek 6.3.

d) Graf pravidelného šestistěnu, viz Obrázek 6.3.


e) Graf pravidelného osmistěnu, viz Obrázek 6.3.

6.2.2. Jaké je chromatické číslo (barevnost) grafu G na Obrázku 6.4?



Obrázek 6.4: *Graf G.*

6.2.3. Jaké je chromatické číslo (barevnost) cirkulantu $C_{10}(1, 2, 5)$ na Obrázku 6.5?



Obrázek 6.5: *Cirkulant $C_{10}(1, 2, 5)$.*

6.2.4. Kolik nejméně hran musíme vynechat z grafu W_8 (viz Obrázek 6.2), aby chromatické číslo výsledného grafu bylo 2?

6.2.5. Kolika nejvýše barvami obarvíme kompletní bipartitní graf s alespoň třemi vrcholy, jestliže mu přidáme jednu hranu?

6.2.6. Kolika nejvýše barvami obarvíme kompletní bipartitní graf, jestliže mu přidáme dvě hrany?

6.2.7. ♦ Kolika barvami lze obarvit strom?


6.2.8. Kolik barev je potřeba na obarvení (jaká je barevnost) $K_n - e$?

6.2.9. Kolik barev je potřeba na obarvení (jaká je barevnost) C_n s jednou přidanou hranou v_1v_i , $i \in [1, n]$?

6.2.10. Mám dán graf G . Co můžeme říci o barvenosti grafu G , jestliže známe $\Delta(G)$?


6.3 Rovinné kreslení grafu

6.3.1. Pokud je to možné, nakreslete graf G na Obrázku 6.6 tak, aby se hrany neprotínaly.



Obrázek 6.6: *Graf G.*

6.3.2. Pokud je to možné, nakreslete graf G na Obrázku 6.7 tak, aby se hrany neprotínaly.



Obrázek 6.7: *Graf G.*

- 6.3.3. Ukažte, že po přidání libovolné hrany do grafu na Obrázku 6.7 výsledný graf již nebude rovinný.
- 6.3.4. Pokud je to možné, nakreslete rovinný graf pravidelného čtyřstěnu.
- 6.3.5. Pokud je to možné, nakreslete rovinný graf pravidelného šestistěnu (krychle).
- 6.3.6. Pokud je to možné, nakreslete rovinný graf pravidelného osmstěnu.
- 6.3.7. Nakreslete rovinný graf pravidelného dvanáctistěnu.
- 6.3.8. Nakreslete rovinný graf pravidelného dvacetistěnu.
- 6.3.9. Nakreslete rovinný graf osmstěnu a najděte odpovídající duální graf.
- 6.3.10. Nakreslete rovinný graf dvanáctistěnu a najděte odpovídající duální graf.
- 6.3.11. Máme nějaké rovinné nakreslení pravidelného osmstěnu. Stěny pravidelného osmstěnu jsou trojúhelníky.
- Kolik má oblastí?
 - Kolik má hran?
 - Kolik má vrcholů?
 - Kolik dalších hran můžeme do roviného nakreslení osmstěnu přidat tak, aby graf zůstal rovinný?
- 6.3.12. Máme nějaké rovinné nakreslení pravidelného šestistěnu (krychle).
- Kolik má oblastí?
 - Kolik má hran?
 - Kolik má vrcholů?
 - Kolik dalších hran můžeme do roviného nakreslení krychle přidat tak, aby graf zůstal rovinný?
- 6.3.13. Máme nějaké rovinné nakreslení pravidelného dvanáctistěnu. Stěny pravidelného dvanáctistěnu jsou pětiúhelníky.
- Kolik má oblastí?
 - Kolik má hran?
 - Kolik má vrcholů?
 - Kolik dalších hran můžeme do roviného nakreslení dvanáctistěnu přidat tak, aby graf zůstal rovinný?
- 6.3.14. Máme nějaké rovinné nakreslení pravidelného dvacetistěnu. Stěny pravidelného dvacetistěnu jsou trojúhelníky.
- Kolik má oblastí?
 - Kolik má hran?
 - Kolik má vrcholů?
 - Kolik dalších hran můžeme do roviného nakreslení dvacetistěnu přidat tak, aby graf zůstal rovinný?
- 6.3.15. Kolik má souvislý rovinný graf stěn, víte-li že má
- 20 vrcholů a 25 hran?

- b) 16 vrcholů a 15 hran?
- c) 25 vrcholů a 22 hran?
- d) 5 vrcholů a 10 hran?

6.3.16. Nakreslete graf K_4 tak, aby

- a) se hrany neprotínaly
- b) a navíc aby byly úsečky.

6.3.17. Nakreslete graf $K_5 - e$ tak, aby

- a) se hrany neprotínaly
- b) a navíc aby byly úsečky.

6.3.18. Nakreslete graf $K_{3,3} - e$ tak, aby

- a) se hrany neprotínaly
- b) a navíc aby byly úsečky.

6.3.19. Najděte rovinný graf, který má nejmenší stupeň vrcholů 5.

6.3.20.* Najděte nekonečně mnoho neisomorfních souvislých rovinných grafů, které mají nejmenší stupeň vrcholů 5.

6.3.21. Do rovinného nakreslení stromu přidáme dvě hrany, které se navzájem nekříží a nekříží ani žádnou původní hranu stromu. Kolik bude mít výsledný graf oblastí (stěn)?

6.4 Rozpoznání rovinných grafů

6.4.1.♡ Pro která n je graf K_n rovinný? Zdůvodněte.


6.4.2.♡ Pro která m, n je graf $K_{m,n}$ rovinný? Zdůvodněte.

6.4.3. Existuje rovinné nakreslení pro $K_6 - C_3$? Zdůvodněte.

6.4.4. Nakreslete nějaký rovinný graf s 12 hranami a 8 stěnami.

6.4.5. Nakreslete nějaký rovinný graf s 21 hranami a 16 stěnami.

6.4.6.* Je graf G na Obrázku 6.8 rovinný? Zdůvodněte.



Obrázek 6.8: Graf G .

6.4.7. Najděte chybu v následujícím důkazu: Mějme takový graf G , že na jeho dobré vrcholové barvení je potřeba alespoň 5 barev. V grafu G musí být vrcholy stupně alespoň 5, které jsou sousední s vrcholy čtyř ostatních barev, jinak bychom je mohli přebarvit a použít méně než 5 barev. Jiste najdeme takovou množinu pěti vrcholů různé barvy, které tvoří podgraf K_5 .

V roviném grafu podle Kuratowského věty neexistuje podgraf isomorfní s K_5 a proto (podle předchozího zdůvodnění) naobarvení roviného grafu budou stačit vždy čtyři barvy.

6.5 Barvení map a rovinných grafů

6.5.1. Kolik nejméně barev je třeba na dobré vrcholové barvení rovinného nakreslení grafů?

- a) $K_5 - e$
- b) $K_{3,3} - e$

6.5.2. Najdete rovinný graf, na jehož obarvení je potřeba alespoň 5 barev? Zdůvodněte.

6.5.3. Kolik barev je třeba na dobré obarvení hyperkrychle Q_n ?

6.5.4. Najdete graf s největším stupněm 2 na jehož dobré vrcholové barvení jsou potřeba alespoň 3 barvy? Zdůvodněte.

6.5.5. Najděte graf s největším stupněm r na jehož dobré vrcholové barvení je potřeba alespoň $r+1$ barev.

6.5.6. Najdete graf s největším stupněm 3 na jehož dobré vrcholové barvení je potřeba minimálně 5 barev? Zdůvodněte.

6.5.7. Je Petersenův graf rovinný? Zdůvodněte.

6.6 Příklady k procvičení

6.6.1. Máme dánu hyperkrychli rádu n , značíme ji Q_n (viz strana 48).

- a) Jaký je počet vrcholů Q_n ?
- b) Jaký je stupeň vrcholů v grafu Q_n ?
- c) Jaký je počet hran Q_n ?
- d) Jaké je chromatické číslo Q_n ?
- e) Pro které hodnoty n je graf Q_n rovinný?

6.6.2. Podle předpisů se káva nesmí skladovat společně s rýží, rýže s moukou, mouka s jablkem a jablka se nesmí skladovat společně s tropickým ovocem. Kolik nejméně místností je potřeba pro uskladnění všech druhů zboží?

6.6.3. Máme za úkol pronajmout skladové prostory, ve kterých se budou skladovat broskve, kukuřice, papriky, pšenice, rajčata, švestky a konzervy. Podle předpisů se obiloviny nesmí skladovat společně s ovocem, rajčata ani papriky se nesmí skladovat s pšenicí nebo kukuřicí a broskve se nesmí skladovat s rajčaty. Kolik nejméně místností je třeba pronajmout pro uskladnění všech druhů zboží?

6.6.4. Kolik hran stačí přidat do cyklu C_n , aby výsledný graf nebyl rovinný?

6.6.5. Máme dány hyperkrychli Q_4 (viz strana 48). Je Q_4 rovinný graf?

6.6.6. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ uveděte příklad grafu G , aby platilo $\Delta(G) - \chi(G) \geq k$.

7 Toky v sítích


Pojem síť a definice toku v síti jsou popsány ve skriptech [UTG].

7.1 Definice sítě

- 7.1.1. Pro které vrcholy síť neplatí zákony kontinuity?
- 7.1.2. Jak v síti namodelovat neorientovanou hranu?
- 7.1.3. Může pro (jediný) zdroj platit zákon kontinuity?
- 7.1.4. Může v síti něco přitékat do zdroje?
- 7.1.5. Může být tok na hranách vycházející ze zdroje větší, než tok na hranách přítékajících do stoku?

7.2 Hledání maximálního toku


- 7.2.1. Máme dánu síť $S = (G, z, s, w)$ na Obrázku 7.1.



Obrázek 7.1: Síť (G, z, s, w) .

- a) Jaká je hodnota největšího toku v síti S ? Najděte jej!
- b) Jaká je kapacita minimálního řezu v síti S ? Najděte minimální řez.
- c) Jak vypadá množina U po skončení algoritmu?


- 7.2.2. Máme dánu síť $S = (G, z, s, w)$ na Obrázku 7.2.



Obrázek 7.2: Síť (G, z, s, w) .

- a) Jaká je hodnota největšího toku v síti S ? Najděte jej!
- b) Jaká je kapacita minimálního řezu v síti S ? Najděte minimální řez.
- c) Jak vypadá množina U po skončení algoritmu?


- 7.2.3. Máme dánu síť $S = (G, z, s, w)$ na Obrázku 7.3.



Obrázek 7.3: Síť (G, z, s, w) .

- a) Jaká je hodnota největšího toku v síti S ? Najděte jej!
- b) Jaká je kapacita minimálního řezu v síti S ? Najděte minimální řez.
- c) Jak vypadá množina U po skončení algoritmu?


7.2.4. Máme dánu síť $S = (G, z, s, w)$ na Obrázku 7.4.



Obrázek 7.4: Síť (G, z, s, w) .

- a) Jaká je hodnota největšího toku v síti S ? Najděte jej!
- b) Jaká je kapacita minimálního řezu v síti S ? Najděte minimální řez.
- c) Jak vypadá množina U po skončení algoritmu?

7.2.5. Máme dánu síť $S = (G, z, s, w)$ na Obrázku 7.5.




Obrázek 7.5: Síť (G, z, s, w) .

- a) Jaká je hodnota největšího toku v síti S ? Najděte jej!
- b) Jaká je kapacita minimálního řezu v síti S ? Najděte minimální řez.
- c) Jak vypadá množina U po skončení algoritmu?

7.3 Zobecnění sítí a další aplikace

7.3.1. Najděte největší párování v následujícím grafu. Zdůvodněte, proč neexistuje větší párování.

Obrázek 7.6: Bipartitní graf G .

7.3.2. Existuje systém různých reprezentantů pro následující systém množin? Pokud ano, najděte ho, pokud ne, dokážte to.

$$M_1 = \{1, 2, 4\}, M_2 = \{1, 3, 7\}, M_3 = \{1, 5, 6\}, M_4 = \{2, 6, 7\}, M_5 = \{2, 3, 5\}, M_6 = \{3, 4, 6\}, M_7 = \{4, 5, 7\}$$

7.3.3. Existuje systém různých reprezentantů pro následující systém množin? Pokud ano, najděte ho, pokud ne, dokážte to.

$$M_1 = \{1, 4, 5\}, M_2 = \{1, 4, 6\}, M_3 = \{1, 5, 6\}, M_4 = \{2, 3, 5\}, M_5 = \{4, 5, 6\}, M_6 = \{4, 5, 7\}, M_7 = \{4, 6, 7\}$$

7.4 Příklady k procvičení

7.4.1. Najděte příklad sítě, kde kapacity hran jsou celočíselné a maximální tok není celočíselný.

Reference

- [ZDM] M. Kubesa, Základy diskrétní matematiky, VŠB–TU Ostrava, skriptum (2012).
- [UTG] P. Kovář, Úvod do teorie grafů, VŠB–TU Ostrava, skriptum (2021).
- [H] P. Hliněný, Diskrétní matematika, skriptum, VŠB (2005).
- [TG] P. Kovář, Teorie grafů, VŠB–TU Ostrava, skriptum (2022).
- [MN] J. Matoušek, J. Nešetřil, Kapitoly z diskrétní matematiky, Univerzita Karlova, Praha (2003),
- [DMA] K.H. Rosen, Discrete Mathematics and its Applications – 6th ed., McGraw-Hill, New York (2007).
- [W] D. B. West, Introduction to graph theory – 2nd ed., *Prentice-Hall*, Upper Saddle River NJ, (2001).