

9. Úvod do spektrální teorie

Úvod do spektrální teorie

1. Vlastní čísla a vektory
2. Charakteristický mnohočlen a spektrum
3. Invariantnost vzhledem k podobnosti
4. Součet a součin vlastních čísel
5. Lokalizace vlastních čísel
6. Spektrum reálné symetrické matice

9.1 Vlastní čísla a vektory

DEFINICE 1

Nechť $A \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ je lineární transformace definovaná na vektorovém prostoru \mathcal{V} . Jestliže existuje nenulový vektor $e \in \mathcal{V}$ a skalár λ tak, že

$$Ae = \lambda e, \quad (*)$$

pak se λ nazývá *vlastní číslo* transformace A , e se nazývá *vlastní vektor* příslušný k λ a (λ, e) se nazývá *vlastní dvojice* transformace A .

9.1 Vlastní čísla a vektory

DEFINICE 1

Nechť $A \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ je lineární transformace definovaná na vektorovém prostoru \mathcal{V} . Jestliže existuje nenulový vektor $e \in \mathcal{V}$ a skalár λ tak, že

$$Ae = \lambda e, \quad (*)$$

pak se λ nazývá *vlastní číslo* transformace A , e se nazývá *vlastní vektor* příslušný k λ a (λ, e) se nazývá *vlastní dvojice* transformace A .

V případě konečněrozměrných vektorových prostorů ztotožňujeme lineární transformaci s její maticí vzhledem k nějaké bázi. Pak mluvíme o vlastních číslech a vektorech čtvercové matice pro něž platí analogický vztah ke vztahu (*).

9.1 Vlastní čísla a vektory

Rovnost (*) si můžeme zapsat pomocí identity ve tvaru

$$(A - \lambda I)\mathbf{e} = \mathbf{o},$$

takže λ je vlastním číslem A , právě když $A - \lambda I$ není prosté zobrazení, a vlastní vektory A příslušné k λ jsou prvky jádra $A - \lambda I$.

9.1 Vlastní čísla a vektory

Rovnost (*) si můžeme zapsat pomocí identity ve tvaru

$$(A - \lambda I)\mathbf{e} = \mathbf{o},$$

takže λ je vlastním číslem A , právě když $A - \lambda I$ není prosté zobrazení, a vlastní vektory A příslušné k λ jsou prvky jádra $A - \lambda I$.

Množina všech vlastních čísel $A \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ je podmnožinou množiny $\sigma(A)$ všech skalárů λ , pro které neexistuje $(A - \lambda I)^{-1}$. Množina $\sigma(A)$ se nazývá *spektrum* transformace A a pro transformace prostorů konečné dimenze je totožná s množinou všech vlastních čísel A .

9.1 Vlastní čísla a vektory

PŘÍKLAD 1 Nechť

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Pak vektory standardní báze $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$ jsou vlastní vektory matice \mathbf{A} odpovídající po řadě vlastním číslům 1 a 2, neboť

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{a} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

9.1 Vlastní čísla a vektory

PŘÍKLAD 1 Nechť

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Pak vektory standardní báze $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$ jsou vlastní vektory matice \mathbf{A} odpovídající po řadě vlastním číslům 1 a 2, neboť

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{a} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

PŘÍKLAD 2 Nechť \mathcal{V} je libovolný vektorový prostor a I je identické zobrazení definované na \mathcal{V} . Pak pro každý vektor $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ platí

$$I\mathbf{v} = 1 \cdot \mathbf{v},$$

takže každý nenulový vektor je vlastním vektorem identity odpovídající vlastnímu číslu 1 a $\sigma(I) = \{1\}$.

9.2 Charakteristický mnohočlen a spektrum

Je-li \mathbf{A} čtvercová matice, tak násobení maticí $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ není prosté zobrazení, právě když $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ je singulární. Pak skalár $\lambda \in \sigma(\mathbf{A})$, právě když $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$.

9.2 Charakteristický mnohočlen a spektrum

Je-li \mathbf{A} čtvercová matice, tak násobení maticí $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ není prosté zobrazení, právě když $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ je singulární. Pak skalár $\lambda \in \sigma(\mathbf{A})$, právě když $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$.

Výraz $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ se nazývá *charakteristický mnohočlen* matice \mathbf{A} a každé vlastní číslo $\lambda \in \sigma(\mathbf{A})$ je kořenem *charakteristické rovnice*

$$|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = 0.$$

9.2 Charakteristický mnohočlen a spektrum

Je-li \mathbf{A} čtvercová matice, tak násobení maticí $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ není prosté zobrazení, právě když $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ je singulární. Pak skalár $\lambda \in \sigma(\mathbf{A})$, právě když $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$.

Výraz $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ se nazývá *charakteristický mnohočlen* matice \mathbf{A} a každé vlastní číslo $\lambda \in \sigma(\mathbf{A})$ je kořenem *charakteristické rovnice*

$$|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = 0.$$

Podle takzvané základní věty algebry má každá algebraická rovnice s komplexními koeficienty alespoň jeden komplexní kořen. Odtud vyplývá, že *každá čtvercová matice* považovaná za transformaci konečněrozměrného komplexního prostoru *má neprázdné spektrum*.

9.2 Charakteristický mnohočlen a spektrum

PŘÍKLAD 3 Vypočtěte vlastní čísla a vektory matice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

9.2 Charakteristický mnohočlen a spektrum

PŘÍKLAD 3 Vypočtěte vlastní čísla a vektory matice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0,$$

9.2 Charakteristický mnohočlen a spektrum

PŘÍKLAD 3 Vypočtěte vlastní čísla a vektory matice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0,$$

odkud $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$.

9.2 Charakteristický mnohočlen a spektrum

PŘÍKLAD 3 Vypočtete vlastní čísla a vektory matice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0,$$

odkud $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$.

Vlastní vektory matice \mathbf{A} vypočteme postupně řešením soustav $(\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{I})\mathbf{e} = \mathbf{o}$

$$\lambda_1 : \quad \begin{array}{l} -x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{array}$$

$$\lambda_2 : \quad \begin{array}{l} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0, \end{array}$$

9.2 Charakteristický mnohočlen a spektrum

PŘÍKLAD 3 Vypočtěte vlastní čísla a vektory matice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0,$$

odkud $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$.

Vlastní vektory matice \mathbf{A} vypočteme postupně řešením soustav $(\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{I})\mathbf{e} = \mathbf{o}$

$$\lambda_1 : \quad \begin{array}{l} -x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{array}$$

$$\lambda_2 : \quad \begin{array}{l} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0, \end{array}$$

odkud

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{a} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

9.2 Charakteristický mnohočlen a spektrum

PŘÍKLAD 3 Vypočtěte vlastní čísla a vektory matice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0,$$

odkud $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$.

Vlastní vektory matice \mathbf{A} vypočteme postupně řešením soustav $(\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{I})\mathbf{e} = \mathbf{o}$

$$\lambda_1 : \quad \begin{array}{l} -x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{array} \qquad \lambda_2 : \quad \begin{array}{l} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0, \end{array}$$

odkud

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{a} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Snadno si ověříme, že

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

9.3 Invariantnost vzhledem k podobnosti

Necht' A je libovolná čtvercová matice a necht'

$$Ae = \lambda e.$$

9.3 Invariantnost vzhledem k podobnosti

Necht' A je libovolná čtvercová matice a necht'

$$Ae = \lambda e.$$

Po přenásobení této rovnice libovolnou regulární maticí T dostaneme

$$TAe = \lambda Te,$$

9.3 Invariantnost vzhledem k podobnosti

Necht' A je libovolná čtvercová matice a necht'

$$Ae = \lambda e.$$

Po přenásobení této rovnice libovolnou regulární maticí T dostaneme

$$TAe = \lambda Te,$$

odtud

$$TAT^{-1}(Te) = \lambda(Te).$$

9.3 Invariantnost vzhledem k podobnosti

Necht' A je libovolná čtvercová matice a necht'

$$A\mathbf{e} = \lambda\mathbf{e}.$$

Po přenásobení této rovnice libovolnou regulární maticí T dostaneme

$$T A \mathbf{e} = \lambda T \mathbf{e},$$

odtud

$$T A T^{-1}(T\mathbf{e}) = \lambda(T\mathbf{e}).$$

Odtud plyne, že *podobné matice mají stejná vlastní čísla.*

9.3 Invariantnost vzhledem k podobnosti

Necht' \mathbf{A} je libovolná čtvercová matice a necht'

$$\mathbf{A}\mathbf{e} = \lambda\mathbf{e}.$$

Po přenásobení této rovnice libovolnou regulární maticí \mathbf{T} dostaneme

$$\mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{e} = \lambda\mathbf{T}\mathbf{e},$$

odtud

$$\mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1}(\mathbf{T}\mathbf{e}) = \lambda(\mathbf{T}\mathbf{e}).$$

Odtud plyne, že *podobné matice mají stejná vlastní čísla*.

Použitím věty o součinu determinantů dostaneme

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} - \lambda\mathbf{I}) &= |\mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} - \lambda\mathbf{T}\mathbf{I}\mathbf{T}^{-1}| = |\mathbf{T}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{T}^{-1}| = \\ &= |\mathbf{T}||\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}||\mathbf{T}^{-1}| = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}),\end{aligned}$$

9.3 Invariantnost vzhledem k podobnosti

Necht' \mathbf{A} je libovolná čtvercová matice a necht'

$$\mathbf{A}\mathbf{e} = \lambda\mathbf{e}.$$

Po přenásobení této rovnice libovolnou regulární maticí \mathbf{T} dostaneme

$$\mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{e} = \lambda\mathbf{T}\mathbf{e},$$

odtud

$$\mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1}(\mathbf{T}\mathbf{e}) = \lambda(\mathbf{T}\mathbf{e}).$$

Odtud plyne, že *podobné matice mají stejná vlastní čísla*.

Použitím věty o součinu determinantů dostaneme

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} - \lambda\mathbf{I}) &= |\mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} - \lambda\mathbf{T}\mathbf{I}\mathbf{T}^{-1}| = |\mathbf{T}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{T}^{-1}| = \\ &= |\mathbf{T}||\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}||\mathbf{T}^{-1}| = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}),\end{aligned}$$

takže *podobné matice mají stejný charakteristický mnohočlen*.

9.4 Součet a součin vlastních čísel

LEMMA 1 Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová matice n -tého řádu. Pak

1. $\lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n = \det \mathbf{A}$
2. $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = a_{11} + \dots + a_{nn}$ (tzv. *stopa matice*)

9.5 Lokalizace vlastních čísel

VĚTA 1 (GERŠGORIN)

Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová komplexní matice řádu n a nechť

$$r_i = |a_{i1}| + \cdots + \widehat{|a_{ii}|} + \cdots + |a_{in}| \text{ a } \mathcal{S}_i = \{x \in \mathbb{C} : |x - a_{ii}| \leq r_i\},$$

kde stříška nad symbolem značí jeho vynechání. Pak

$$\sigma(\mathbf{A}) \subset \mathcal{S}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{S}_n.$$

9.5 Lokalizace vlastních čísel

VĚTA 1 (GERŠGORIN)

Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová komplexní matice řádu n a nechť

$$r_i = |a_{i1}| + \cdots + \widehat{|a_{ii}|} + \cdots + |a_{in}| \text{ a } \mathcal{S}_i = \{x \in \mathbb{C} : |x - a_{ii}| \leq r_i\},$$

kde stříška nad symbolem značí jeho vynechání. Pak

$$\sigma(\mathbf{A}) \subset \mathcal{S}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{S}_n.$$

DŮKAZ: Nechť $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathbf{x} = [x_i]$ a $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$. Pak $a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = \lambda x_i$, odkud převedením členu $a_{ii}x_i$ na pravou stranu dostaneme

$$a_{i1}x_1 + \cdots + \widehat{a_{ii}x_i} + \cdots + a_{in}x_n = (\lambda - a_{ii})x_i.$$

9.5 Lokalizace vlastních čísel

VĚTA 1 (GERŠGORIN)

Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová komplexní matice řádu n a nechť

$$r_i = |a_{i1}| + \cdots + \widehat{|a_{ii}|} + \cdots + |a_{in}| \text{ a } \mathcal{S}_i = \{x \in \mathbb{C} : |x - a_{ii}| \leq r_i\},$$

kde stříška nad symbolem značí jeho vynechání. Pak

$$\sigma(\mathbf{A}) \subset \mathcal{S}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{S}_n.$$

DŮKAZ: Nechť $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathbf{x} = [x_i]$ a $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$. Pak $a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = \lambda x_i$, odkud převedením členu $a_{ii}x_i$ na pravou stranu dostaneme

$$a_{i1}x_1 + \cdots + \widehat{a_{ii}x_i} + \cdots + a_{in}x_n = (\lambda - a_{ii})x_i.$$

Pomocí vlastností absolutní hodnoty tak snadno ověříme, že platí

$$|a_{i1}||x_1| + \cdots + \widehat{|a_{ii}||x_i|} + \cdots + |a_{in}||x_n| \geq |\lambda - a_{ii}||x_i|. \quad (*)$$

9.5 Lokalizace vlastních čísel

VĚTA 1 (GERŠGORIN)

Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová komplexní matice řádu n a nechť

$$r_i = |a_{i1}| + \cdots + \widehat{|a_{ii}|} + \cdots + |a_{in}| \text{ a } \mathcal{S}_i = \{x \in \mathbb{C} : |x - a_{ii}| \leq r_i\},$$

kde stříška nad symbolem značí jeho vynechání. Pak

$$\sigma(\mathbf{A}) \subset \mathcal{S}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{S}_n.$$

DŮKAZ: Nechť $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathbf{x} = [x_i]$ a $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$. Pak $a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = \lambda x_i$, odkud převedením členu $a_{ii}x_i$ na pravou stranu dostaneme

$$a_{i1}x_1 + \cdots + \widehat{a_{ii}x_i} + \cdots + a_{in}x_n = (\lambda - a_{ii})x_i.$$

Pomocí vlastností absolutní hodnoty tak snadno ověříme, že platí

$$|a_{i1}||x_1| + \cdots + \widehat{|a_{ii}||x_i|} + \cdots + |a_{in}||x_n| \geq |\lambda - a_{ii}||x_i|. \quad (*)$$

Nechť i je takové, že $|x_i| = \max_j |x_j|$. Jelikož $|x_i| > 0$, platí $|x_j|/|x_i| \leq 1$.

9.5 Lokalizace vlastních čísel

VĚTA 1 (GERŠGORIN)

Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová komplexní matice řádu n a nechť

$$r_i = |a_{i1}| + \cdots + \widehat{|a_{ii}|} + \cdots + |a_{in}| \text{ a } \mathcal{S}_i = \{x \in \mathbb{C} : |x - a_{ii}| \leq r_i\},$$

kde stříška nad symbolem značí jeho vynechání. Pak

$$\sigma(\mathbf{A}) \subset \mathcal{S}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{S}_n.$$

DŮKAZ: Nechť $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathbf{x} = [x_i]$ a $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$. Pak $a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = \lambda x_i$, odkud převedením členu $a_{ii}x_i$ na pravou stranu dostaneme

$$a_{i1}x_1 + \cdots + \widehat{a_{ii}x_i} + \cdots + a_{in}x_n = (\lambda - a_{ii})x_i.$$

Pomocí vlastností absolutní hodnoty tak snadno ověříme, že platí

$$|a_{i1}||x_1| + \cdots + \widehat{|a_{ii}||x_i|} + \cdots + |a_{in}||x_n| \geq |\lambda - a_{ii}||x_i|. \quad (*)$$

Nechť i je takové, že $|x_i| = \max_j |x_j|$. Jelikož $|x_i| > 0$, platí $|x_j|/|x_i| \leq 1$.

Vydělíme-li nerovnost (*) $|x_i|$, dostaneme

$$|a_{i1}| + \cdots + \widehat{|a_{ii}|} + \cdots + |a_{in}| \geq |\lambda - a_{ii}|,$$

tedy $\lambda \in \mathcal{S}_i$.

9.5 Lokalizace vlastních čísel

PŘÍKLAD 4 Pomocí Geršgorinovy věty najděte co nejmenší část komplexní roviny, která obsahuje spektrum matice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & i & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & i & 4 \end{bmatrix}$$

9.5 Lokalizace vlastních čísel

PŘÍKLAD 4 Pomocí Geršgorinovy věty najděte co nejmenší část komplexní roviny, která obsahuje spektrum matice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & i & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & i & 4 \end{bmatrix}$$

ŘEŠENÍ: $r_1 = |i| + |0| = 1$, $r_2 = 1 + 1 = 2$, $r_3 = 1 + |i| = 2$.

9.5 Lokalizace vlastních čísel

PŘÍKLAD 4 Pomocí Geršgorinovy věty najděte co nejmenší část komplexní roviny, která obsahuje spektrum matice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & i & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & i & 4 \end{bmatrix}$$


ŘEŠENÍ: $r_1 = |i| + |0| = 1$, $r_2 = 1 + 1 = 2$, $r_3 = 1 + |i| = 2$. Odtud $\mathcal{S}_1 = \{x \in \mathbb{C} : |x - 2| \leq 1\}$, $\mathcal{S}_2 = \{x \in \mathbb{C} : |x - 3| \leq 2\}$, $\mathcal{S}_3 = \{x \in \mathbb{C} : |x - 4| \leq 2\}$, takže $\sigma(\mathbf{A}) \subset \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2 \cup \mathcal{S}_3$.

9.5 Lokalizace vlastních čísel

PŘÍKLAD 4 Pomocí Geršgorinovy věty najděte co nejmenší část komplexní roviny, která obsahuje spektrum matice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & i & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & i & 4 \end{bmatrix}$$

ŘEŠENÍ: $r_1 = |i| + |0| = 1$, $r_2 = 1 + 1 = 2$, $r_3 = 1 + |i| = 2$. Odtud $\mathcal{S}_1 = \{x \in \mathbb{C} : |x - 2| \leq 1\}$, $\mathcal{S}_2 = \{x \in \mathbb{C} : |x - 3| \leq 2\}$, $\mathcal{S}_3 = \{x \in \mathbb{C} : |x - 4| \leq 2\}$, takže $\sigma(\mathbf{A}) \subset \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2 \cup \mathcal{S}_3$. Část komplexní roviny obsahující $\sigma(\mathbf{A})$ je na obrázku, kde je vyšrafována oblast obsahující $\sigma(\mathbf{A})$. Z obrázku plyne, že $0 \notin \sigma(\mathbf{A})$, takže matice \mathbf{A} je regulární.



9.6 Spektrum reálné symetrické matice

VĚTA 2

Nechť A je reálná symetrická matice. Pak $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.

9.6 Spektrum reálné symetrické matice

VĚTA 2

Nechť A je reálná symetrická matice. Pak $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.

VĚTA 3

Vlastní vektory reálné symetrické matice A odpovídající různým vlastním číslům jsou ortogonální.

9.6 Spektrum reálné symetrické matice

VĚTA 5

Nula je vlastním číslem matice A právě tehdy, když A je singulární.
Je-li matice A regulární, pak nula není jejím vlastním číslem.

9.6 Spektrum reálné symetrické matice

VĚTA 5

Nula je vlastním číslem matice A právě tehdy, když A je singulární. Je-li matice A regulární, pak nula není jejím vlastním číslem.

VĚTA 6

Jestliže k matici A existuje její inverze A^{-1} , pak λ je vlastním číslem matice A právě tehdy, je-li $\frac{1}{\lambda}$ vlastním číslem matice A^{-1} .