

---

# 5. Vektorové prostory

# Vektorové prostory

---

1. Algebraické operace
2. Vektorový prostor
3. Vlastnosti vektorových prostorů
4. Vektorové podprostory
5. Součet a průnik podprostorů
6. Vektory v matematice a ve fyzice

# 5.1 Algebraické operace

## DEFINICE 1

(Binární) *algebraická operace*  $\circ$  na neprázdné množině  $A$  je zobrazení

$$\circ : A \times A \ni (a, b) \mapsto a \circ b \in A.$$

Operace  $\circ$  na množině  $A$  tedy každé uspořádané dvojici  $(a, b) \in A \times A$  prvků  $a, b \in A$  přiřazuje jednoznačně určený prvek  $a \circ b \in A$ .

**PŘÍKLAD 1** Sčítání  $+$  definované na množině reálných čísel  $\mathbb{R}$ , které například dvojici  $(2, 3) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  přiřazuje prvek  $2 + 3 = 5 \in \mathbb{R}$ .

# 5.1 Algebraické operace

---

**PŘÍKLAD 2** Sčítání reálných (komplexních) aritmetických vektorů stejné dimenze nebo sčítání a násobení reálných (komplexních) čtvercových matic stejného řádu.

**PŘÍKLAD 3** Skládání zobrazení  $\circ$  definované na množině všech zobrazení  $\mathcal{Z}(\mathcal{A})$  dané množiny  $\mathcal{A}$  do sebe. Tato operace přiřazuje každé uspořádané dvojici zobrazení  $(f, g) \in \mathcal{Z}(\mathcal{A}) \times \mathcal{Z}(\mathcal{A})$  složené zobrazení  $f \circ g \in \mathcal{Z}(\mathcal{A})$  definované pro každé  $x \in \mathcal{A}$  předpisem

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Jestliže například  $f \in \mathcal{Z}(\mathbb{R})$  a  $g \in \mathcal{Z}(\mathbb{R})$  jsou definovány předpisem  $f(x) = x^2$  a  $g(x) = x^2 + 1$ , pak

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (x^2 + 1)^2.$$

# 5.2 Vektorový prostor

## DEFINICE 2

*Reálným (komplexním) vektorovým prostorem* rozumíme množinu  $\mathcal{V}$  s algebraickou operací  $+$  :  $\mathcal{V} \times \mathcal{V} \ni (\mathbf{u}, \mathbf{v}) \mapsto \mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathcal{V}$ , kterou nazýváme *sčítání vektorů* a zobrazením  $\mathbb{R}(\mathbb{C}) \times \mathcal{V} \ni (\alpha, \mathbf{v}) \mapsto \alpha \mathbf{v} \in \mathcal{V}$ , které nazýváme *násobení skalárem*, přičemž platí:

$$\mathbf{VP1} \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V} : \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$$

$$\mathbf{VP2} \quad \exists \mathbf{o} \in \mathcal{V} \forall \mathbf{u} \in \mathcal{V} : \mathbf{u} + \mathbf{o} = \mathbf{o} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$$

$$\mathbf{VP3} \quad \forall \mathbf{u} \in \mathcal{V} \exists -\mathbf{u} \in \mathcal{V} : \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = -\mathbf{u} + \mathbf{u} = \mathbf{o}$$

$$\mathbf{VP4} \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{V} : \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$\mathbf{VP5} \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{V} : \alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha \mathbf{u} + \alpha \mathbf{v}$$

$$\mathbf{VP6} \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \forall \mathbf{u} \in \mathcal{V} : (\alpha + \beta)\mathbf{u} = \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{u}$$

$$\mathbf{VP7} \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \forall \mathbf{u} \in \mathcal{V} : \alpha(\beta \mathbf{u}) = (\alpha \beta)\mathbf{u}$$

$$\mathbf{VP8} \quad \forall \mathbf{u} \in \mathcal{V} : 1\mathbf{u} = \mathbf{u}$$

## 5.2 Vektorový prostor

---

**PŘÍKLAD 4** Reálné aritmetické vektory daného řádu  $n$  se sčítáním vektorů a s násobením skalárem po složkách tvoří reálný vektorový prostor. Jeho nulový prvek je  $\mathbf{o} = [0, \dots, 0]$ , pro  $\mathbf{a} = [a_1, \dots, a_n]$  je inverzním prvkem  $-\mathbf{a} = [-a_1, \dots, -a_n]$ . Pro  $n = 1$  je množina skalárů i vektorů stejná.

**PŘÍKLAD 5** Množina  $\mathcal{F}$  všech reálných funkcí s operací  $+$  definovanou pro každé reálné  $x$  rovností

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

a s násobením skalárem, které pro každé  $\alpha \in \mathbb{R}$  a  $f \in \mathcal{F}$  definuje funkci  $\alpha f \in \mathcal{F}$  rovností  $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$ , tvoří reálný vektorový prostor. Nulový prvek  $o$  tohoto prostoru je dán předpisem  $o(x) = 0$ , prvek opačný k  $f$  je definován pomocí  $(-f)(x) = -f(x)$ .

# 5.3 Vlastnosti vektorových prostorů

## VĚTA 1

Nechť  $\mathcal{V}$  je vektorový prostor s nulovým prvkem  $\mathbf{o}$ ,  $\mathbf{u} \in \mathcal{V}$  a nechť  $\alpha$  je libovolný skalár. Pak platí následující rovnosti:

1.  $0\mathbf{u} = \mathbf{o}$
2.  $\alpha\mathbf{o} = \mathbf{o}$
3.  $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$

DŮKAZ:

$$1. \quad 0\mathbf{u} \stackrel{VP2}{=} 0\mathbf{u} + \mathbf{o} \stackrel{VP3}{=} 0\mathbf{u} + (0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u})) \stackrel{VP1}{=} (0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}) + (-0\mathbf{u}) = \stackrel{VP6}{=} (0 + 0)\mathbf{u} + (-0\mathbf{u}) = 0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u}) \stackrel{VP3}{=} \mathbf{o}.$$

2. Použijeme-li 1 pro  $\mathbf{u} = \mathbf{o}$ , dostaneme  $0\mathbf{o} = \mathbf{o}$ , takže

$$\alpha\mathbf{o} = \alpha(0\mathbf{o}) \stackrel{VP7}{=} (\alpha 0)\mathbf{o} = 0\mathbf{o} = \mathbf{o}.$$

$$3. \quad \mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} \stackrel{VP8}{=} 1\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} \stackrel{VP6}{=} (1 + (-1))\mathbf{u} = 0\mathbf{u} \stackrel{1}{=} \mathbf{o}.$$

# 5.4 Vektorový podprostor

## DEFINICE 3

Neprázdná množina  $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$  je *podprostorem* vektorového prostoru  $\mathcal{V}$ , jestliže  $\mathcal{U}$  je vektorový prostor vzhledem ke sčítání vektorů a násobení skalárem v prostoru  $\mathcal{V}$ .

## VĚTA 2

Množina  $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$  je podprostorem vektorového prostoru  $\mathcal{V}$  právě tehdy, když pro libovolné dva prvky  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$  a pro libovolný skalár  $\alpha$  platí:

1.  $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathcal{U}$
2.  $\alpha\mathbf{u} \in \mathcal{U}$

DŮKAZ: Z 2 plyne  $0\mathbf{u} \in \mathcal{U}$  i  $(-1)\mathbf{u} \in \mathcal{U}$ , takže podle 1. a 3. věty 1 také nulový prvek  $\mathbf{o} = 0\mathbf{u}$  i opačný prvek  $-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}$  patří do  $\mathcal{U}$ . Ostatní axiomy vektorového prostoru jsou splněny zřejmě také.



## 5.4 Vektorový podprostor

---

**PŘÍKLAD 6** Nechť  $p$  je pevně zvolená přímka v prostoru procházející zvoleným počátkem souřadnic. Pak množina všech polohových vektorů bodů na přímce  $p$  tvoří podprostor vektorového prostoru všech vázaných vektorů v prostoru.

**PŘÍKLAD 7** Pro dané  $k \geq 1$  je množina  $\mathcal{P}_k$  všech mnohočlenů stupně menšího než  $k$  podprostorem vektorového prostoru  $\mathcal{F}$  z příkladu 5.

**PŘÍKLAD 8** Nechť  $\mathcal{V}$  je libovolný prostor. Pak  $\mathcal{O} = \{\mathbf{o}\}$  je podprostorem  $\mathcal{V}$ , neboť  $\mathbf{o} + \mathbf{o} = \mathbf{o}$  a pro libovolný skalár  $\alpha$  platí, že  $\alpha\mathbf{o} = \mathbf{o}$ . Vektorový prostor  $\mathcal{O}$  je nejmenší podprostor daného vektorového prostoru a nazývá se *nulovým podprostorem*.

## 5.4 Vektorový podprostor

---

**PŘÍKLAD 9** Nechť  $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$  je konečná množina vektorů vektorového prostoru  $\mathcal{V}$ . Množina všech vektorů, které lze zapsat ve tvaru  $\mathbf{u} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k$  je podprostorem vektorového prostoru  $\mathcal{V}$ , který nazýváme *lineární obal* množiny  $\mathcal{S}$ . Lineární obal dané množiny vektorů  $\mathcal{S}$  značíme  $\langle \mathcal{S} \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \rangle$ .

**PŘÍKLAD 10**  $\mathcal{U} = \{[u_1, u_2, u_3] \in \mathbb{R}^3 : u_1 - 2u_2 + u_3 = 0\}$  tvoří podprostor vektorového prostoru  $\mathbb{R}^3$ . Vyřešíme-li soustavu jedné rovnice o třech neznámých  $u_1 - 2u_2 + u_3 = 0$  dostaneme řešení ve tvaru  $u_1 = 2t - s, u_2 = t, u_3 = s$  s parametry  $t, s \in \mathbb{R}$ . Pak můžeme podprostor  $\mathcal{U}$  zapsat ve tvaru:

$$\begin{aligned} \mathcal{U} &= \{[2t - s, t, s], t, s \in \mathbb{R}\} = \{t[2, 1, 0] + s[-1, 0, 1], t, s \in \mathbb{R}\} = \\ &= \langle [2, 1, 0], [-1, 0, 1] \rangle. \end{aligned}$$

# 5.5 Součet a průnik podprostorů

Pro libovolné dva podprostory  $\mathcal{U}, \mathcal{V}$  daného vektorového prostoru  $\mathcal{W}$  můžeme vytvořit *průnik podprostorů*  $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$  jako průnik množin  $\mathcal{U}, \mathcal{V}$  a *součet podprostorů*

$$\mathcal{U} + \mathcal{V} = \{\mathbf{u} + \mathbf{v} : \mathbf{u} \in \mathcal{U}, \mathbf{v} \in \mathcal{V}\}.$$

Průnik podprostorů není nikdy prázdný, neboť do něho vždy patří nulový prvek.

## VĚTA 2

Nechť  $\mathcal{U}, \mathcal{V}$  jsou podprostory vektorového prostoru  $\mathcal{W}$ . Pak  $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$  i  $\mathcal{U} + \mathcal{V}$  jsou podprostory  $\mathcal{W}$ .

DŮKAZ: Necht'  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ , tedy  $\mathbf{u} \in \mathcal{U}$ ,  $\mathbf{u} \in \mathcal{V}$ ,  $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$  a  $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ . Jelikož  $\mathcal{U}$  a  $\mathcal{V}$  jsou podprostory téhož prostoru, platí  $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathcal{U}$  a  $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathcal{V}$ , tedy  $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ , a pro libovolný skalár  $\alpha$  platí také  $\alpha\mathbf{u} \in \mathcal{U}$  i  $\alpha\mathbf{u} \in \mathcal{V}$ , takže  $\alpha\mathbf{u} \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ . Důkaz, že  $\mathcal{U} + \mathcal{V}$  je podprostorem  $\mathcal{W}$  je obdobný.

# 5.5 Součet a průnik podprostorů

**PŘÍKLAD 11** Jsou dány podprostory vektorového prostoru  $\mathbb{R}^3$ :

$$\mathcal{U} = \{[u_1, u_2, u_3] \in \mathbb{R}^3 : u_1 - 2u_2 + u_3 = 0\} \text{ a}$$

$$\mathcal{V} = \{[v_1, v_2, v_3] \in \mathbb{R}^3 : v_2 + v_3 = 0\}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{U} \cap \mathcal{V} &= \{[u_1, u_2, u_3] \in \mathbb{R}^3 : u_1 - 2u_2 + u_3 = 0 \wedge u_2 + u_3 = 0\} = \\ &= \{[u_1, u_2, u_3] : u_1 = -3t, u_2 = -t, u_3 = t, t \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{[-3t, -t, t], t \in \mathbb{R}\} = \langle [-3, -1, 1] \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{U} + \mathcal{V} &= \{[u_1, u_2, u_3] : u_1 = 2t - s, u_2 = t, u_3 = s, t, s \in \mathbb{R}\} + \\ &+ \{[v_1, v_2, v_3] : v_1 = p, v_2 = -q, v_3 = q, p, q \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{[2t - s + p, t - q, s + q], t, s, p, q \in \mathbb{R}\} = \\ &= \langle [2, 1, 0], [-1, 0, 1], [1, 0, 0], [0, -1, 1] \rangle \end{aligned}$$

Jestliže průnik podprostorů  $\mathcal{U}, \mathcal{V}$  daného vektorového prostoru  $\mathcal{W}$  je nulový podprostor  $\mathcal{O}$ , pak se součet  $\mathcal{U} + \mathcal{V}$  nazývá *direktní (přímý) součet podprostorů* a značí se  $\mathcal{U} \oplus \mathcal{V}$ .

# 5.6 Vektory v matematice a fyzice

---

- Vektorové prostory zobecňují pojem vektoru známého např. z fyziky, tj. veličina mající velikost a směr
  - Nejedná se o veličiny, které mají velikost a směr (Co je velikost vektoru z prostoru všech funkcí  $\mathcal{F}$ ?)
  - Dokonce i veličiny, které mají velikost a směr nemusí splňovat axiomy vektorového prostoru
- V případě abstraktních vektorů je někdy možné je pro zjednodušení nahradit "šipkami", tj. veličinami, které mají velikost a směr.