

## Domácí úkol č. 28

1. Řešte soustavu lineárních rovnic.

$$\begin{aligned}(1+i)x + (1-i)y &= 1 \\ x - iy &= 0\end{aligned}$$

2. Vypočtěte inverzní matici k

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Správně uzávorkujte a vypočtěte výraz

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{x}, \text{ kde } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

4. Rozhodněte, zda jsou vektory  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$  lineárně nezávislé:

$$\mathbf{u} = (2, -2, 1), \mathbf{v} = (2, 2, 2), \mathbf{w} = (-1, -1, 1).$$

5. Rozhodněte, zda je  $p \in \mathcal{P}_2 := \{a_0 + a_1x + a_2x^2 : a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$  lineární kombinací  $p_1, p_2, p_3 \in \mathcal{P}_2$ , kde

$$p(x) = 1 + 2x - 2x^2, p_1(x) = 2 + 2x^2, p_2(x) = -1 - 2x^2, p_3(x) = x^2.$$

6. Určete bázi a dimenzi  $\mathcal{V}$ :

$$\mathcal{V} := \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}.$$

7. Mějme vektorový prostor  $\mathcal{P}_2 := \{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 : a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$ . Vypočtěte souřadnice vektorů

$$p(x) := 3x^2 - 2x - 5, \quad q(x) := x^2 - 2$$

v bázi  $E := \{\mathbf{e}_1(x), \mathbf{e}_2(x), \mathbf{e}_3(x)\}$ , kde

$$\mathbf{e}_1(x) := x + 1, \quad \mathbf{e}_2(x) := x^2 - x, \quad \mathbf{e}_3(x) := -x - 2.$$

8. Rozhodněte, zda zobrazení  $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$  definované předpisem

$$\mathcal{A}((x_1, x_2, x_3)) = (x_1 - 2x_2, 2x_1 + x_3, x_1 + x_2 + x_3)$$

je lineární.

9. Nalezněte obor hodnot a jeho dimenzi lineárního zobrazení  $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^2$  definovaného předpisy

$$\begin{aligned}\mathcal{A}((1, 1, -1)) &= (1, 1) \\ \mathcal{A}((1, -1, 1)) &= (2, 2) \\ \mathcal{A}((-1, 1, 1)) &= (-1, -1).\end{aligned}$$

10. Je dáno lineární zobrazení  $\mathcal{A} : \mathcal{P}_2 \mapsto \mathbb{R}^3$  definované předpisy

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(1+x-x^2) &= (1, 1, 1) \\ \mathcal{A}(1-x+x^2) &= (-2, 1, 0) \\ \mathcal{A}(-1+x+x^2) &= (1, -1, 0)\end{aligned}$$

Nalezněte alespoň jeden  $p \in \mathcal{P}_2$  takový, že  $\mathcal{A}(p) = (1, 2, 3)$ .

11. Nalezněte matici lineárního zobrazení  $\mathcal{L} : \mathbb{R}_3 \ni (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1 + x_2 + x_3, x_2 + x_3) \in \mathbb{R}_2$  vzhledem ke standartním bázím.
12. Vypočtěte ortogonální (v eukleidovském skalárním součinu) projekci vektoru  $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$  do roviny určené vektory  $\mathbf{v} = (1, -1, 0)$  a  $\mathbf{w} = (1, 1, 1)$ .
13. Klasifikujte následující matici kvadratické formy:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -10 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

14. Zjistěte, které vektory  $\mathbf{e}_1 := (2, 0, -2, 0)$ ,  $\mathbf{e}_2 := (-1, 1, -1, -2)$  a  $\mathbf{e}_3 := (0, -2, 0, 0)$  jsou vlastními vektory matice

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} -7 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 12 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

15. Vypočtěte vlastní čísla a jim příslušné vlastní vektory matice

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$